

ranitidina cinfa® 150 mg - E.F.G.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Ranitidina (D.C.I.) (clorhidrato) 150 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina granulada, talco, hidroxipropilmetilcelulosa, aceite de ricino hidrogenado, carboximetilalmidón de sodio, dióxido de titanio, estearato de magnesio, sílice coloidal, triacetina.

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Cada envase contiene 28 comprimidos recubiertos

ACTIVIDAD

La ranitidina es un antagonista de los receptores H₂ de la histamina.

ranitidina cinfa® 150 mg reduce la cantidad de ácido que se produce en el estómago. De esta manera, puede curar rápidamente las úlceras, la inflamación de esófago, estómago y duodeno, y aliviar el dolor.

TITULAR Y FABRICANTE

LABORATORIOS CINFA, S.A.
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta
31620 Huarte - Pamplona (Navarra). España

INDICACIONES

Este medicamento está indicado en úlcera de estómago o duodeno y ardor (sensación de ácido en el estómago).

CONTRAINDICACIONES

Ranitidina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a este fármaco o a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES

Este medicamento debe administrarse siempre bajo la indicación de su médico.

Pacientes que padezcan alguna enfermedad en el riñón, deben reducir la dosis según la pauta indicada en la posología.

Advertir al médico o farmacéutico si alguna vez ha tenido que dejar de tomar un medicamento para el tratamiento de esta enfermedad por alergia o algún otro problema.

INTERACCIONES

En caso de seguir un tratamiento para enfermedad del riñón o tratamiento de la enfermedad actual advertir al médico.

ADVERTENCIAS

Embarazo y lactancia:

Se recomienda evitar la administración durante el embarazo (especialmente en los tres primeros meses) o en la lactancia, a menos que a juicio del médico se estime imprescindible.

Efectos sobre la capacidad de conducción:

No se han descrito.

Uso en ancianos:

Las indicaciones y posología son las mismas que las recomendadas para adultos.

Uso en niños:

La dosis recomendada para niños se indica en el apartado POSOLOGÍA.

POSOLOGÍA

Seguir las indicaciones dadas por su médico. Ver INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO. En caso de duda, consultar a su médico o farmacéutico.

Adultos:

La dosis habitual en úlceras de estómago o duodeno y en caso de ardor (acidez de esófago) es 150 mg (1 comprimido) dos veces al día o bien 300 mg (2 comprimidos) por la noche durante 4 a 6 semanas.

En ciertos casos, podrá administrarse hasta 150 mg (1 comprimido) cuatro veces al día durante un tiempo de hasta 12 semanas.

Seguir tomando los comprimidos, hasta que finalice el período de tratamiento mandado por el médico.

En caso de olvidar tomar una dosis, tomar otra tan pronto como se recuerde. Luego, continuar como antes.

Aunque note una mejoría al cabo de unos días, no se debe dejar de tomar los comprimidos hasta completar el tratamiento, ya que puede no haberse curado la úlcera y volverían el dolor y el malestar.

Una vez observada una notable mejoría, el médico puede mandarle otro período de tratamiento con comprimidos de **ranitidina cinfra® 150 mg**, para así prevenir que aparezcan de nuevo el dolor y el malestar. Dependiendo de la enfermedad para la cual está recibiendo tratamiento, la dosis habitual es de 150 mg (1 comprimido) ó 300 mg (2 comprimidos) una vez al día, después de la cena, o bien 150 mg (1 comprimido) dos veces al día.

Niños:

La dosis depende del peso del niño. La dosis habitual varía entre 2 y 4 mg por Kg de peso. La dosis máxima es 300 mg (2 comprimidos) al día. Asegúrese de que el niño tome la dosis prescrita por el médico.

Administrar cada comprimido con ayuda de un poco de agua. Si tiene dificultad en la ingestión de los comprimidos comuníquese al médico o farmacéutico.

SOBREDOSIS

La posibilidad de intoxicación es muy baja, a menos que se tomen muchos comprimidos de una sola vez. En caso de sobredosis acudir inmediatamente al médico o al servicio de urgencias del hospital más próximo llevando este prospecto con usted o consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

En la mayoría de los pacientes no se han observado reacciones adversas. No obstante, al igual que sucede con la mayor parte de los medicamentos, algunas personas pueden notar efectos secundarios.

Avisar al médico inmediatamente si oye pitidos, siente dolor u opresión en el pecho, hinchazón de párpados, cara o labios o si aparecen urticaria o bultos en la piel.

En caso de advertir una coloración amarilla en la piel (ictericia), erupción en la piel (manchas rojas), dolor fuerte de estómago, notar algún cambio en el tipo de dolor o si se encuentra aturdido, avisar al médico tan pronto como sea posible.

Advertir al médico de la aparición de cualquiera de los siguientes efectos secundarios: dolor de cabeza, mareo, dolor muscular o en las articulaciones o bien si se encuentra deprimido.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de tomar todos los comprimidos indicados y no sentirse mejor, **comunicarlo al médico tan pronto como sea posible.**

CONSERVACIÓN

Guardar los comprimidos de **ranitidina cinfra®150 mg** alejados de cualquier fuente de calor, para evitar su deterioro.

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

OTRAS PRESENTACIONES

ranitidina cinfa[®] 300 mg, comprimidos recubiertos. Envase con 14 y 28 comprimidos.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE
FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS
NIÑOS

CON RECETA MÉDICA

TEXTO REVISADO: Mayo de 1998.