

PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral** y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral**.
3. Cómo tomar **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral**.

acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral EFG

El principio activo es acetilcisteína.

Cada sobre contiene:

Acetilcisteína 200 mg.

Los demás componentes son: Aspartamo (E-951), aroma de naranja, colorante Sunset Yellow (E-110), manitol (E-421) y sílice coloidal anhidra.

Titular y responsable de la fabricación:

Laboratorios Cinfa, S.A.

C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.

31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

1. QUÉ ES acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral Y PARA QUÉ SE UTILIZA

acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral se presenta en forma de polvo para solución oral. Cada sobre de **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral** contiene 200 mg de acetilcisteína como principio activo.

Cada envase contiene 30 sobres.

Acetilcisteína pertenece a un grupo de medicamentos llamados mucolíticos y se utiliza para fluidificar las secreciones bronquiales excesivas y/o espesas.

2. ANTES DE TOMAR acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral

No tome acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral:

- Si es alérgico a la acetilcisteína, o a alguno de los excipientes declarados en la composición.
- Si Usted padece úlcera gastroduodenal.
- Si es Usted asmático o presenta insuficiencia respiratoria grave

Tenga especial cuidado con acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral:

- Si padece problemas respiratorios.

La presencia de un leve olor sulfúreo en el preparado no indica que éste esté alterado, sino que es propia del principio activo acetilcisteína

Toma de acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral con alimentos y bebidas:

No se han descrito interferencias si se toma **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral** con alimentos y bebidas.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito interferencias si se está tomando **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral** sobre la conducción y/o el uso de máquinas.

Información importante sobre algunos de los componentes de acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral:

acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral contiene como excipiente aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada sobre del mismo contiene 3.75 mg de fenilalanina.

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Tenga en cuenta que estas instrucciones pueden ser también de aplicación a medicamentos que haya tomado antes o que pueda tomar después.

Si está tomando medicamentos contra la tos o que reducen las secreciones bronquiales, consulte a su médico antes de tomar **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral** conjuntamente con éstos.

3. CÓMO TOMAR acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

La dosis correspondiente de **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral** se toma disuelta directamente en un vaso de agua.

Si Usted estima que la acción de **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Su médico le indicará la duración del tratamiento con **acetilcisteína cifa 200 mg polvo para solución oral**. No suspenda el tratamiento antes, ya que entonces no se logrará el efecto previsto.

La dosis diaria recomendada para adultos y niños mayores de 7 años es de 600 mg de acetilcisteína, 1 sobre de **acetilcisteína cifa 200 mg** 3 veces al día (200 mg de acetilcisteína 3 veces al día), sin sobrepasar la dosis diaria de 600 mg.

La dosis diaria recomendada en niños de edades entre 2 y 7 años es de 300 mg de acetilcisteína (1 sobre de **acetilcisteína cinfa 100 mg** 3 veces al día), sin sobrepasar la dosis diaria de 300 mg.

La dosis diaria recomendada en niños de edades hasta 2 años es de 200 mg de acetilcisteína, (1 sobre de **acetilcisteína cinfa 100 mg** 2 veces al día), sin sobrepasar la dosis diaria de 200 mg.

En casos de complicación pulmonar de la fibrosis quística, la dosis media recomendada de acetilcisteína es la siguiente:

- Adultos y niños mayores de 7 años: De 200 a 400 mg de acetilcisteína cada 8 horas.
- Niños entre 2 y 7 años: 200 mg de acetilcisteína cada 8 horas.
- Niños hasta 2 años: De 100 a 200 mg de acetilcisteína cada 12 horas.

Si Usted toma más cantidad de acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral de la que debiera:

Debe consultar inmediatamente a su médico o farmacéutico.

La acetilcisteína ha sido administrada a dosis muy elevadas en humanos sin que se hayan producido efectos secundarios significativos, por lo que prácticamente se puede excluir la posibilidad de intoxicación por sobredosificación debida a la acetilcisteína.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar el Servicio de Información Toxicológica (Tel. 91.562.04.20), indicando el producto y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral:

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral** puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente se han descrito efectos aislados, de carácter leve y transitorio, siendo los más frecuentes gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarreas). Raramente se presentan reacciones de hipersensibilidad, acompañadas de urticaria y broncoespasmos, caso en el que se recomienda interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral

No conservar a temperatura superior a 30°C.

No utilizar **acetilcisteína cinfa 200 mg polvo para solución oral** después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS
--

Este prospecto ha sido aprobado en Noviembre de 2004.