

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
desloratadina cinafa 5 mg comprimidos recubiertos con película
Desloratadina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- **Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.**
- **Si tiene alguna duda, consulte a su médico, o farmacéutico o enfermero.**
- **Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas de la enfermedad, ya que puede perjudicarles.**
- **Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico o enfermero incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.**

Contenido del prospecto:

1. Qué es desloratadina cinafa y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar desloratadina cinafa
3. Cómo tomar desloratadina cinafa
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de desloratadina cinafa
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es desloratadina cinafa y para qué se utiliza

desloratadina cinafa es un medicamento antialérgico que no produce somnolencia. Ayuda a controlar la reacción alérgica y sus síntomas.

desloratadina cinafa alivia los síntomas asociados a diferentes tipos de rinitis alérgica (por ejemplo, fiebre del heno, alergia a ácaros del polvo) tales como estornudos, goteo o picor nasal, picor en el paladar, picor en los ojos y enrojecimiento de ojos o lagrimeo.

desloratadina cinafa también se utiliza para el alivio de los síntomas asociados a la urticaria idiopática crónica tales como picores y ronchas cutáneas.

El alivio de estos síntomas dura un día completo y le ayuda a continuar sus actividades diarias y a tener periodos de sueño normales.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar desloratadina cinafa

No tome desloratadina cinafa

- Si es alérgico (hipersensible) a desloratadina o a cualquiera de los demás componentes de desloratadina cinafa o a loratadina.
- desloratadina cinafa está indicado en adultos mayores de 12 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar desloratadina cinafa.

- Si usted tiene la función renal alterada.

Interacción de desloratadina cinafa con otros medicamentos

No hay interacciones conocidas de desloratadina cinafa con otros medicamentos.

desloratadina cinafa con los alimentos, bebidas y alcohol

desloratadina cinafa se puede tomar con independencia de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada o en periodo de lactancia, o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. No se recomienda tomar este medicamento durante el embarazo. No debe tomar desloratadina cifa durante la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

A la dosis recomendada, no se espera que desloratadina cifa provoque somnolencia o le haga disminuir su capacidad de atención. No obstante, muy raramente, algunas personas experimentan somnolencia que puede afectar a su capacidad para conducir o usar máquinas.

3. Cómo tomar desloratadina cifa

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es:

Adultos (mayores de doce años): tomar un comprimido una vez al día.

Tragar el comprimido entero con agua, con o sin alimentos.

Respecto a la duración del tratamiento, su médico determinará el tipo de rinitis alérgica que padece y determinará durante cuánto tiempo debe tomar desloratadina cifa.

Si su rinitis alérgica es intermitente (presencia de síntomas durante menos de 4 días a la semana o durante menos de 4 semanas), su médico le recomendará una pauta de tratamiento que dependerá de la evaluación de la historia de su enfermedad.

Si su rinitis alérgica es persistente (presencia de síntomas durante 4 o más días a la semana y durante más de 4 semanas), su médico puede recomendarle un tratamiento a largo plazo.

Para la urticaria idiopática crónica, la duración del tratamiento puede variar de un paciente a otro y, por lo tanto, deberá seguir las instrucciones de su médico.

Si toma más desloratadina cifa de la que debiera

Tome desloratadina cifa solamente en la forma en que se le ha prescrito. No se espera que una sobredosis accidental cause problemas graves. No obstante, si toma más desloratadina cifa de la que le han dicho, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.

Si olvidó tomar desloratadina cifa

Si olvidó tomar su dosis a su hora, tómela lo antes posible y después continúe con el esquema de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, desloratadina cifa puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. En los ensayos con adultos, los efectos adversos fueron aproximadamente los mismos que con un comprimido que no contiene principio activo, y la fatiga, la sequedad de boca y el dolor de cabeza se comunicaron con mayor frecuencia que con un comprimido que no contiene principio activo.

En adolescentes, el dolor de cabeza fue la reacción adversa comunicada más frecuentemente.

Durante la comercialización de desloratadina, se han comunicado algunos efectos adversos: muy raramente casos de reacciones alérgicas graves (dificultad al respirar, respiración con pitos, picor,

ronchas cutáneas e hinchazón) y erupción cutánea. También se han comunicado muy raramente palpitations, latidos cardíacos rápidos, dolor de estómago, náuseas (ganas de vomitar), vómitos, estómago revuelto, diarrea, mareo, somnolencia, dificultad para dormir, dolor muscular, alucinaciones, convulsiones, agitación con aumento de movimiento corporal, inflamación del hígado y alteración en las pruebas de la función hepática.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

5. Conservación de desloratadina cinfa

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Conservar en el embalaje original.

No tome este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el cartón y en el blíster. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Si observa algún cambio en el aspecto de los comprimidos, comuníquese a su farmacéutico.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de desloratadina cinfa

- El principio activo es desloratadina.

- Los demás componentes del comprimido son:

Núcleo: carbonato sódico anhidro, celulosa microcristalina (E-460i), almidón de maíz, talco, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.

Recubrimiento: polivinilalcohol, dióxido de titanio (E-171), talco, polietilenglicol, macrogol (Opadry II White) e indigotina (E-132).

Aspecto del producto y contenido del envase de desloratadina cinfa

desloratadina cinfa 5 mg comprimidos recubiertos con película se presenta en envases de 20 comprimidos y 100 (envase clínico) comprimidos.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Laboratorios Cinfa, S.A.

C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.

31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

Este prospecto fue aprobado en Enero de 2012

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) www.aemps.gob.es/