

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

**En este prospecto se explica:**

- 1. Qué es amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral y para qué se utiliza.**
- 2. Antes de tomar amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral.**
- 3. Cómo tomar amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral.**
- 4. Posibles efectos adversos.**
- 5. Conservación de amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral.**

**amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral**

Cada sobre contiene: amoxicilina (D.C.I.) (trihidrato), 1000 mg.

Excipientes: citrato trisódico, sílice coloidal anhidra, bióxido de titanio, aroma de frambuesa, lauril sulfato sódico, estearato magnésico y sacarosa, c.s.

**Titular:**

LABORATORIOS CINFA, S.A.  
Olaz-Chipi, 10 – Polígono Areta  
31620 Huarte-Pamplona (Navarra)

**Responsable de la fabricación:**

LABORATORIOS REIG JOFRÉ, S.A.  
Jarama, s/n (Polígono Industrial) - 45007 Toledo

**1. QUÉ ES amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

amoxicilina cinfa 1 g se presenta en forma de sobres, en estuches conteniendo 12 ó 24 sobres.

El principio activo es amoxicilina, un antibiótico semisintético que actúa impidiendo que se forme la pared externa de la célula bacteriana.

amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral es activo frente a muchos microorganismos que producen infecciones frecuentes.

amoxicilina cinfa 1 g polvo para suspensión oral se utiliza:

En el tratamiento de las infecciones de la garganta, nariz y oídos.

En el tratamiento de las infecciones del aparato respiratorio inferior, tanto de los bronquios como de los pulmones.

En el tratamiento de las infecciones del aparato genito-urinario, es decir, infecciones de la vejiga y de la uretra.

En el tratamiento de las infecciones de la piel.

En el tratamiento de las infecciones dentales.

En el tratamiento de las infecciones de las vías biliares.

En el tratamiento de la enfermedad de Lyme.

En el tratamiento de la fiebre tifoidea y paratifoidea (especialmente para tratar a los portadores crónicos de la enfermedad).

En el tratamiento de las infecciones para suprimir la bacteria (*Helicobacter pylori*) que contribuye a la aparición de la úlcera gástrica, en asociación con otros medicamentos.  
Para prevenir la infección cardíaca (endocarditis) en caso de intervención o extracción dental.

## **2. ANTES DE TOMAR amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral**

### **No tome amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral:**

Si es alérgico a cualquiera de sus componentes.

Si es alérgico a las penicilinas o a otro tipo de antibióticos denominados cefalosporinas.

Si tiene una enfermedad denominada mononucleosis infecciosa.

### **Tenga especial cuidado con amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral:**

Si tiene antecedentes de alergia, especialmente si es alergia a los medicamentos.

### **Embarazo y lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

No se recomienda su uso durante la lactancia.

### **Información importante sobre alguno de los componentes de amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral:**

Este medicamento contiene aproximadamente 3,6 g de sacarosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos.

### **Toma de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No se debe tomar junto a otros antibióticos del grupo de las tetraciclinas o del cloranfenicol.

No se debe tomar junto a probenecid.

No debe administrarse junto con un medicamento para el tratamiento de la gota (alopurinol), porque pueden aparecer problemas cutáneos.

Como ocurre con otros antibióticos, puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales, por lo que deberá tomar las precauciones adecuadas.

## **3. CÓMO TOMAR amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral**

amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral se administra por vía oral.

**En adultos y niños de más de 40 kg:** se recomienda una dosis de 500 mg tres veces al día, ó 1 g (1 sobre) 2 ó 3 veces al día. En caso de infecciones graves, puede aumentarse la dosis hasta tomar como máximo 6 g/día en dosis equivalentes, 3 veces al día.

**En el tratamiento de la enfermedad de Lyme:** Eritema migratorio localizado: 4 g/24 h. En caso de empeoramiento de los síntomas, su médico valorará aumentar la dosis hasta 6 g/24 h.

**En las infecciones por *Helicobacter pylori*:** de 2-3 g/día en dosis divididas, asociado a un inhibidor de la bomba de protones, y en su caso a otros antibióticos, durante 14 días.

**En el tratamiento de la cistitis simple en la mujer:** se recomienda una dosis única de 3 g.

**Ancianos:** No es necesario ajustar la dosis, se utilizarán las mismas dosis que para los adultos, a menos que exista evidencia de insuficiencia renal (ver insuficiencia renal).

**Insuficiencia renal:** en el caso de insuficiencia renal leve, no es necesario modificar la dosis. En caso de enfermedad renal moderada, se recomienda administrar como máximo 500 mg de amoxicilina, 2 veces al día. En caso de enfermedad grave, se recomienda administrar como máximo 500 mg de amoxicilina una vez al día.

**Profilaxis de endocarditis:** en adultos se recomienda administrar 3 g una hora antes de la manipulación/extracción dental. Se puede aplicar una segunda dosis 6-8 horas después si se considera necesario. En los niños de 5 a 10 años se recomienda administrar la mitad de la dosis del adulto.

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.  
Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración del tratamiento con amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral. No suspenda el tratamiento antes, ya que la infección podría reaparecer.

**Si usted toma más amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral de la que debiera:**

Si ha tomado más dosis de la recomendada, puede tener molestias abdominales como náuseas, vómitos o diarrea. Consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de toma excesiva o accidental de amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral, consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto en la cantidad ingerida.

**Si olvidó tomar amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral:**

Tome su dosis lo antes posible. Si faltara poco tiempo para tomar la siguiente dosis, espere hasta ese momento para tomar su sobre.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

**Efectos que se dan cuando se interrumpe el tratamiento con amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral:**

Si se interrumpe el tratamiento antes de finalizar el período de tiempo indicado por su médico, se puede volver a manifestar su enfermedad.

#### 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral puede tener efectos adversos.

**Reacciones alérgicas:** pueden aparecer enrojecimiento, manchas y picor de la piel, que a veces desaparecen sin necesidad de abandonar el tratamiento. Es raro que se presenten otras reacciones alérgicas más graves.

**Reacciones gastrointestinales:** pesadez de estómago, náuseas, diarrea y vómitos. Raramente han aparecido casos de infecciones por hongos o inflamación del intestino durante el uso de antibióticos.

**Efectos en el hígado:** a veces se pueden alterar las pruebas de laboratorio. Raramente aparece hepatitis o ictericia.

**Efectos en la sangre:** raramente aparece una disminución de cierto tipo de células de la sangre, o se altera su coagulación.

**Efectos sobre el Sistema Nervioso Central:** raramente se presentan hiperactividad, mareos y convulsiones. Esto puede ocurrir en pacientes con enfermedad renal o en aquellos que han tomado dosis altas de amoxicilina.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

#### **5. CONSERVACIÓN DE amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral**

Conservar en el envase original.

#### **Caducidad**

No utilice amoxicilina cifa 1 g polvo para suspensión oral después de la fecha de caducidad indicada en la caja.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.**

**Este prospecto ha sido aprobado en Julio de 2001.**