

## amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos EFG

### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aún cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

### **En este prospecto:**

1. Qué es **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** y para qué se utiliza
2. Antes de tomar **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**
3. Cómo tomar **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**

## amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos EFG

Cada comprimido recubierto contiene:

Amoxicilina (D.O.E) (trihidrato).....	500 mg
Ácido clavulánico (D.O.E) (sal de potasio).....	125 mg

Los excipientes son: celulosa microcristalina, sílice coloidal anhidra, croscarmelosa de sodio, butilhidroxitolueno (E-321), talco, estearato de magnesio, hipromelosa, dióxido de titanio (E-171), macrogol 400, óxido de hierro negro (E-172), goma laca y propilenglicol.

### **Titular:**

Laboratorios Cinfa, S.A.  
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.  
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

### **Fabricante:**

Ranbaxy Ireland Limited  
Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary  
Irlanda

### **1. QUÉ ES amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

**amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** se presenta en envases que contienen 12 ó 24 comprimidos recubiertos.

Pertenece al grupo de medicamentos denominados antibióticos asociados a un inhibidor de enzimas  $\beta$ -lactamasas; activos frente a la mayoría de las bacterias implicadas en las infecciones más habituales.

**amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** está indicado en el tratamiento de infecciones producidas por bacterias en las siguientes localizaciones:

- Infecciones de tipo respiratorio, tales como, sinusitis, otitis media, y amigdalitis recurrente, bronquitis agudas, exacerbaciones agudas de bronquitis crónicas, bronconeumonía y neumonía.
- Infecciones genito-urinarias e infecciones abdominales.
- Infecciones de la piel y tejidos blandos.
- Infecciones dentales.

## **2. ANTES DE TOMAR amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**

### **No tome este medicamento:**

- Si es alérgico a las penicilinas, a las cefalosporinas o a cualquier otro componente de la formulación.
- Si padece alguna enfermedad grave de hígado.

### **Tenga especial cuidado con amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos:**

- Si después de tomar el medicamento se produjera alguna reacción alérgica. En este caso, suspenda el tratamiento y acuda a su médico lo antes posible
- Si tiene problemas en el hígado o en el riñón
- Si le tienen que realizar algún análisis de sangre, ya que puede alterar los resultados del mismo.

### **Toma de amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos con los alimentos y bebidas:**

Para evitar molestias gastrointestinales, tome este medicamento al inicio de las comidas.

### **Embarazo y Lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Su médico valorará la necesidad de emplear este medicamento.

### **Conducción y uso de máquinas:**

No se han observado efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria

### **Información importante sobre algunos de los componentes de amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos:**

Por contener una sal potásica es perjudicial para pacientes con dietas pobres en potasio. El exceso de potasio puede producir, después de la administración oral, molestias de estómago y diarrea.

### **Toma o uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Algunos medicamentos pueden reducir o aumentar el efecto de **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** si se toman conjuntamente.

No se recomienda la administración simultánea de amoxicilina/ácido clavulánico con:

- Alopurinol
- Probenecid
- Antibióticos bacteriostáticos (tetraciclinas y cloranfenicol).
- Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando anticonceptivos orales. Al igual que otros antibióticos **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales, por lo que se deben tomar las precauciones adecuadas.

### **3. CÓMO TOMAR amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración del tratamiento. La duración del tratamiento no debe exceder los 14 días sin que su médico valore la conveniencia de continuar el tratamiento.

No suspenda el tratamiento, aún cuando se encuentre mejor, a menos que su médico se lo indique.

Los comprimidos recubiertos de **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg** se deben tomar enteros acompañados de un poco de líquido.

En adultos y mayores de 12 años la posología habitual será de 1 comprimido recubierto dos o tres veces al día, (cada 8 o 12 horas) al inicio de las comidas.

Si estima que la acción de **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si usted tiene alterada la función del riñón o del hígado acuda a su médico para que le recomiende la dosis adecuada para su caso.

#### **Si Usted toma más comprimidos de amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos de los que debiera:**

Si por alguna circunstancia ha tomado más **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** de lo que debe, beba agua en gran cantidad y consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 915620420.

#### **Si olvidó tomar amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos:**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si olvida tomar una dosis, tome la siguiente lo antes posible y continúe como hasta ese momento.

### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Como todos los medicamentos **amoxicilina/ácido clavulánico cinfa® 500/125 mg comprimidos recubiertos** puede tener efectos adversos.

Los efectos adversos de este medicamento son normalmente leves y, por lo general, relacionados con el aparato digestivo (diarrea, náuseas, vómitos, problemas digestivos, etc.). Estos efectos pueden disminuirse e incluso suprimirse tomando el medicamento justo antes de las comidas. Si los síntomas continuaran o llegaran a ser más graves, o en caso de diarreas persistentes, consulte a su médico.

Asimismo se pueden producir reacciones que incluyan síntomas tales como: erupción cutánea con o sin picor, inflamación de la cara y dificultad para tragar. Ante la aparición de estos síntomas interrumpa el tratamiento y consulte a su médico inmediatamente.

Raramente se han producido casos de hepatitis e ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas). Las reacciones adversas hepáticas se han comunicado de forma más frecuente en ancianos y en varones, particularmente en los mayores de 65 años. Este riesgo se incrementa con una duración del tratamiento superior a 14 días.

Raramente pueden presentarse efectos sobre el sistema nervioso central como nerviosismo, vértigo, cefalea y convulsiones.

También raramente se han comunicado alteraciones de la coagulación (aumento del tiempo de hemorragia y del tiempo de protrombina).

Muy raramente se ha asociado a este medicamento con reacciones adversas de mayor gravedad, tanto del aparato digestivo como hepáticas o alérgicas.

Si se observa alguna de estas reacciones adversas o cualquier otra no descrita en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

**5. CONSERVACIÓN DE amoxicilina/ácido clavulánico cifa® 500/125 mg comprimidos recubiertos**

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS

No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar protegido de la luz y de la humedad.

**Caducidad:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

CON RECETA MÉDICA

**Este prospecto ha sido aprobado en Julio de 2002.**