

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

triflusal cinsa 300 mg cápsulas duras EFG triflusal

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento:

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es triflusal cinsa y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar triflusal cinsa.
3. Cómo tomar triflusal cinsa.
4. Posibles reacciones adversas.
5. Conservación de triflusal cinsa.
6. Información adicional.

1. QUÉ ES triflusal cinsa Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Triflusal pertenece a un grupo de medicamentos denominados antiagregantes plaquetarios que actúan evitando la formación de coágulos (trombos) que pueden obstruir los vasos sanguíneos.

Este medicamento está indicado en adultos para reducir el riesgo de reaparición de un infarto de miocardio, de una angina de pecho estable o inestable o de un infarto cerebral en pacientes que han padecido previamente alguno de estos procesos.

También está indicado en pacientes que hayan sido sometidos a una operación de “by-pass” coronario.

2. ANTES DE TOMAR triflusal cinsa

No tome triflusal cinsa:

- Si tiene una úlcera de estómago o antecedentes de úlcera de estómago complicada.
- Si padece cualquier otro trastorno que cause hemorragias.
- Si es alérgico (hipersensible) al triflusal o a cualquiera de los demás componentes de triflusal cinsa.
- Si es alérgico (hipersensible) a los salicilatos.

Tenga especial cuidado con triflusal cinsa:

- Si padece trastornos del riñón o del hígado.
- Si está expuesto a riesgo de hemorragia, sea por traumatismo u otras situaciones patológicas o porque toma, durante periodos prolongados de tiempo, antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos utilizados para tratar el dolor y/o la inflamación de músculos o articulaciones).
- Si va a someterse a alguna intervención quirúrgica. En este caso el riesgo hemorrágico debe evaluarse y, si fuera necesario, tendrá que dejar de tomar triflusal siete días antes de la intervención.

- La seguridad y la eficacia en la población pediátrica menor de 18 años no han sido establecidas por lo tanto no está recomendada su administración.

Consulte a su médico, incluso si cualquiera de las circunstancias anteriormente mencionadas le hubiera ocurrido alguna vez.

Uso de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Ciertos medicamentos pueden interactuar con triflusal, en este caso, puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento.

Es importante que informe a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos: antiinflamatorios no esteroideos, antidiabéticos orales o anticoagulantes orales, ya que pueden intensificarse los efectos de estos medicamentos, incluyendo los del triflusal.

Toma de triflusal cifa con los alimentos y bebidas:

Tomando triflusal cifa con las comidas, disminuye la posibilidad de la aparición de los efectos adversos digestivos.

Embarazo y Lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

En caso de embarazo o lactancia, su médico valorará la utilización de esta medicación.

Conducción y uso de máquinas:

No se han descrito efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria.

3. CÓMO TOMAR triflusal cifa

Siga exactamente las instrucciones de administración de triflusal cifa indicadas por su médico. Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con triflusal cifa. No lo suspenda sin que su médico se lo indique.

La dosis recomendada es de dos cápsulas (600 mg de triflusal) al día, en una toma única o repartida en dos tomas, o de tres cápsulas (900 mg de triflusal) al día, repartida en tres tomas.

Forma de administración:

triflusal cifa se administra por vía oral.

Ingiera la cápsula con una cantidad suficiente de líquido y preferentemente con las comidas.

Si toma más triflusal cifa del que debiera:

Consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91 562 04 20), indicando el medicamento y la cantidad tomada.

Se recomienda llevar el envase y el prospecto del medicamento al profesional sanitario. Una dosis demasiado elevada de triflusal puede producir dolor de cabeza, zumbidos, vértigo, náuseas, vómitos, y respiración acelerada.

Si olvidó tomar triflusal cifa:

En caso de olvido de una dosis, espere a la siguiente. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, triflusal cínfa puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

- Efectos adversos muy frecuentes (más de 1 de 10 personas):

Pesadez de estómago.

- Efectos adversos frecuentes (más o igual de 1 de 100 personas y menos de 1 de 10 personas):

Dolor de cabeza, dolor del abdomen, náuseas, estreñimiento, vómitos, flatulencia y anorexia. Estos síntomas suelen ser leves y desaparecen al cabo de pocos días incluso sin suspender el tratamiento.

- Efectos adversos poco frecuentes (más o igual de 1 de 1.000 personas y menos de 1 de 100 personas):

Se ha observado hemorragia gastrointestinal, distensión abdominal, diarrea, sangre en las heces, sangre en la orina, hematoma, hemorragia nasal, hemorragia rectal, sangrado de las encías y hemorragia cerebral, aumento de la tensión arterial, accidente isquémico transitorio, anemia, disminución anormal del número de plaquetas. Fiebre y síntomas de gripe. Picor y erupción de la piel.

Confusión, vértigo, mareo, convulsiones, zumbido en los oídos, disminución de la capacidad auditiva, alteración del gusto, dificultad al respirar, infección respiratoria de las vías altas (nariz, garganta), infección de vías urinarias.

- Efectos adversos muy raros (menos de 1 de 10.000 personas, incluidos casos aislados):

Reacción alérgica de la piel expuesta a la luz solar.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE triflusal cínfa

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad:

No utilice triflusal cínfa después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de triflusal cinfa:

El principio activo es triflusal. Cada cápsula contiene 300 mg de triflusal.

Los demás componentes son: la gelatina de la cápsula.

Aspecto del producto y contenido del envase:

triflusal cinfa son cápsulas transparentes que contienen un polvo cristalino de color blanco o casi blanco. Se presenta en envases de 30 ó 50 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:

Laboratorios Cinfa, S.A.

Olaz-Chipi, 10 – Polígono Areta

31620 Huarte-Pamplona (Navarra).

Este prospecto ha sido aprobado en Marzo de 2011.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

<http://www.aemps.es/>