

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto:

- 1.- Qué es **norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos** y para qué se utiliza
- 2.- Antes de tomar **norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos**
- 3.- Cómo tomar **norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos**
- 4.- Posibles efectos adversos
- 5.- Conservación de **norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos**
- 5.- Información adicional

1. QUÉ ES norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos Y PARA QUÉ SE UTILIZA

norfloxacino cinsa es un medicamento utilizado para tratar distintas infecciones producidas por gérmenes gram-positivos y gram-negativos.

Pertenece al grupo farmacoterapéutico de los antisépticos y antiinfecciosos urinarios.

norfloxacino cinsa está indicado para:

- Tratamiento de las infecciones del tracto urinario superior e inferior, incluyendo cistitis (inflamación de la vejiga urinaria), pielitis (inflamación de la pelvis renal), cistopielitis (inflamación de la vejiga urinaria y de la pelvis renal) y pielonefritis (inflamación de la pelvis renal y del tejido renal), causadas por bacterias sensibles a norfloxacino.

2. ANTES DE TOMAR norfloxacino cinsa 400 mg comprimidos

No tome norfloxacino cinsa:

- Si es alérgico (hipersensible) a este fármaco, a cualquiera de los componentes de este medicamento o a cualquier otro antibacteriano quinolínico, como por ejemplo, el ácido pipemídico.

Tenga especial cuidado con norfloxacino cinsa:

- Si tiene antecedentes de convulsiones o de factores que puedan desencadenar su aparición.

- Evite la exposición al sol o a los rayos ultravioleta durante el tratamiento debido a posibles riesgos de fotosensibilidad.
- Durante el tratamiento e inmediatamente después de finalizar el mismo, evite el exceso de ejercicio físico.

Toma de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, o ha utilizado recientemente cualquier medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

No se recomienda administrar este medicamento junto a:

- Probenecid (disminuye la eliminación de norfloxacino en orina).
- Teofilina y ciclosporina (posible aumento de reacciones adversas de estos fármacos si se administran conjuntamente con norfloxacino).
- Anticoagulantes orales (el norfloxacino puede aumentar la acción de la warfarina o de sus derivados, con lo que podría alterarse la coagulación de la sangre).
- Antiácidos, sucralfato y preparados con zinc y hierro (reducen la absorción de norfloxacino. Por este motivo, **norfloxacino cifa** sólo debe tomarse 3 ó 4 horas antes o 2 horas después de la administración de estos preparados).
- Nitrofurantoina (ya que se ha demostrado antagonismo con norfloxacino).

Toma de norfloxacino cifa con alimentos y bebidas:

Evite la toma de alcohol mientras esté tomando este medicamento.

La leche y el yogur reducen la absorción del norfloxacino. Por este motivo, **norfloxacino cifa** debe tomarse 1 hora antes que estos alimentos o 2 horas después.

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

No se ha establecido la inocuidad de **norfloxacino cifa** durante el embarazo. **norfloxacino cifa** debería usarse durante el embarazo sólo cuando el médico considere que los posibles efectos beneficiosos justifican el riesgo que corre el feto.

Lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

norfloxacino cifa pasa a la leche materna, por lo que no se aconseja tomar este medicamento durante el periodo de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

No se han descrito efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria.

Información importante sobre alguno de los componentes de este medicamento

Por contener aceite de ricino hidrogenado, puede provocar molestias de estómago y diarrea. Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR norfloxacinó cínfa 400 mg comprimidos

Siga exactamente las instrucciones administradas de **norfloxacinó cínfa** indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas. Recuerde tomar su medicamento.

Su médico le indicará la duración de su tratamiento con **norfloxacinó cínfa**. No suspenda el tratamiento antes, ya que no se obtendrían los resultados esperados.

Los comprimidos deben tragarse enteros, con un poco de agua, en ayunas o durante las comidas.

Adultos:

- Para el tratamiento de infecciones urinarias, la dosis usual es de 1 comprimido (400 mg de norfloxacinó) dos veces al día (cada 12 horas), lo que significa un máximo diario de 2 comprimidos (800 mg de norfloxacinó). La duración del tratamiento será de 7 a 10 días, aunque los síntomas hayan desaparecido antes.
- En mujeres con cistitis aguda (inflamación de la vejiga urinaria) no complicada, la dosis es de 1 comprimido (400 mg de norfloxacinó) dos veces al día (cada 12 horas), lo que significa un máximo diario de 2 comprimidos (800 mg de norfloxacinó). La duración del tratamiento es de 3 días.

Pacientes con insuficiencia renal:

- En pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/minuto, la dosis recomendada es de 1 comprimido (400 mg de norfloxacinó) una vez al día.
- Si la insuficiencia renal es muy avanzada, su médico valorará caso por caso la conveniencia del tratamiento.

Niños:

norfloxacinó cínfa no debe emplearse en niños debido a la posible aparición de artropatías (enfermedad de las articulaciones).

Si estima que la acción de **norfloxacinó cínfa** es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si toma más norfloxacinó cínfa del que debiera:

Si ha tomado más **norfloxacino cifa** de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o bien llame al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 62 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó tomar norfloxacino cifa

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **norfloxacino cifa** puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Las reacciones adversas más frecuentes son: náuseas, pérdida de apetito, diarrea, dolor de cabeza, mareo y reacciones alérgicas (urticaria, erupciones y/o picor en la piel).

En personas de edad avanzada puede aparecer fatiga, somnolencia y confusión.

Raramente se han observado descensos del número de algunas células de la sangre y/o elevaciones de determinados parámetros de la función hepática o renal.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE norfloxacino cifa 400 mg comprimidos

Conservar en el envase original, protegido de la luz y la humedad.

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños

Caducidad:

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

6.-INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de norfloxacino cifa 400 mg comprimidos

El principio activo es norfloxacino. Cada comprimido recubierto contiene 400 mg de norfloxacino.

Los demás componentes (excipientes) son: aceite de ricino hidrogenado, carboximetilalmidón sódico, celulosa microcristalina, sílice coloidal anhidra, crospovidona, estearato de magnesio, hidroxipropilcelulosa (E463) y lactosa monohidrato, hipromelosa, dióxido de titanio y macrogol 4000.

Aspecto del producto y contenido del envase

norfloxacino cinfa 400 mg son comprimidos recubiertos con película, de color blanco, oblongos, biconvexos y ranurados por una cara.

Cada envase contiene 14 comprimidos

Titular de la autorización de comercialización y responsable de fabricación

LABORATORIOS CINFA, S.A.

Olaz-Chipi, 10 – Polígono Areta

31620 Huarte-Pamplona (Navarra)

Este prospecto fue aprobado en Marzo de 2007.