

## PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

### lisinopril cinfa 5 mg comprimidos EFG lisinopril dihidrato

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es lisinopril cinfa y para qué se utiliza.
2. Antes de tomar lisinopril cinfa.
3. Cómo tomar lisinopril cinfa.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de lisinopril cinfa.
6. Información adicional.

#### **1. QUÉ ES lisinopril cinfa Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

lisinopril cinfa pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores del enzima conversor de angiotensina (inhibidor del ECA).

lisinopril cinfa está indicado para el:

- Tratamiento de la hipertensión (presión arterial elevada).
- Tratamiento de la insuficiencia cardiaca (funcionamiento inadecuado del corazón).
- Tratamiento a corto plazo del infarto agudo de miocardio (ataque de corazón).
- Tratamiento de las complicaciones renales de la diabetes tipo II en pacientes con tensión arterial elevada.

#### **2. ANTES DE TOMAR lisinopril cinfa**

##### **No tome lisinopril cinfa:**

- Si es alérgico (hipersensible) al lisinopril o a cualquiera de los demás componentes de lisinopril cinfa.
- Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a cualquier otro medicamento inhibidor del ECA. La reacción alérgica podría haber provocado hinchazón de manos, pies o tobillos, cara, labios, lengua o garganta. También le podría haber provocado dificultad para tragar o respirar (angioedema).
- Si algún miembro de su familia ha tenido una reacción alérgica grave (angioedema) a un inhibidor del ECA o si usted ha tenido una reacción alérgica grave (angioedema) por causas desconocidas.
- Si está embarazada de más de tres meses. También es mejor evitar la toma de este medicamento al principio del embarazo (ver apartado "Embarazo y lactancia").

No tome lisinopril cinfa si se encuentra en alguna de las situaciones descritas anteriormente. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

Si desarrolla tos seca que persiste durante mucho tiempo después de empezar el tratamiento con lisinopril cinfa, consulte a su médico.

#### **Tenga especial cuidado con lisinopril cinfa:**

- Presenta un estrechamiento (estenosis) de la aorta (una de las arterias que hay en el corazón) o un estrechamiento de las válvulas del corazón (válvulas mitrales).
- Presenta un estrechamiento (estenosis) de la arteria renal.
- Presenta un aumento del grosor del músculo cardíaco (conocido como miocardiopatía hipertrófica).
- Padece una enfermedad de los vasos sanguíneos (enfermedad vascular del colágeno).
- Tiene la presión arterial baja. Puede notarlo como sensación de vértigo o mareo, especialmente al ponerse de pie.
- Presenta una alteración de la función renal o está usted en diálisis.
- Tiene problemas hepáticos.
- Tiene diabetes.
- Ha sufrido recientemente diarrea o vómitos.
- Su médico le ha indicado que debe controlar la cantidad de sal en su dieta.
- Tiene niveles altos de colesterol y está recibiendo un tratamiento llamado "aféresis de LDL".
- Debe informar a su médico si piensa que está (o planea quedarse) embarazada. No se recomienda el uso de este medicamento al principio del embarazo, y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 meses ya que puede provocar daños graves al bebé si se utiliza en esta etapa (ver sección sobre embarazo).
- Es de raza negra, ya que lisinopril cinfa podría ser menos efectivo. También es más probable que desarrolle el efecto adverso "angioedema" (una reacción alérgica grave).

Si no está seguro si se encuentra en alguna de las situaciones descritas anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar lisinopril cinfa.

#### **Tratamiento de alergias tales como a las picaduras de insecto**

Informe a su médico si está recibiendo o va a recibir un tratamiento para reducir el efecto de una alergia a la picadura de insectos (tratamiento de desensibilización). Si toma lisinopril cinfa mientras esté recibiendo este tratamiento, podría provocarle una reacción alérgica grave.

#### **Cirugía**

Si se va a someter a una intervención quirúrgica (incluyendo la cirugía dental) informe a su médico o dentista de que está tomando este medicamento. Esto es debido a que puede presentar presión arterial baja (hipotensión) si se le administran ciertos anestésicos locales o generales mientras esté tomando lisinopril cinfa.

#### **Uso de otros medicamentos:**

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Esto es debido a que el lisinopril puede afectar a la forma en que actúan algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden tener efecto sobre este medicamento.

En especial, informe a su médico o farmacéutico si está utilizando alguno de los siguientes medicamentos:

- Otros medicamentos que ayuden a disminuir la presión arterial.
- Medicamentos utilizados para aumentar la eliminación de orina (diuréticos).
- Medicamentos para deshacer coágulos en sangre (normalmente administrados en hospitales).
- Medicamentos betabloqueantes, tales como atenolol y propranolol.
- Medicamentos derivados del nitrato (para problemas cardíacos).
- Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) para el tratamiento del dolor y de la artritis.
- Aspirina (ácido acetilsalicílico), si está tomando más de 3 gramos al día.

- Medicamentos para la depresión y los trastornos mentales, incluyendo el litio.
- Suplementos de potasio o sustitutos de la sal que contengan potasio.
- Insulina o los antidiabéticos orales.
- Medicamentos para el tratamiento del asma.
- Medicamentos para el tratamiento de la congestión nasal o sinusitis u otros tratamientos para el catarro (incluyendo aquellos que pueda adquirir en la farmacia).
- Medicamentos para inhibir la respuesta inmunitaria del cuerpo (inmunodepresores).
- Alopurinol (para la gota).
- Procainamida (para los trastornos del ritmo cardíaco).
- Medicamentos que contengan sales de oro, como por ejemplo aurotiomalato de sodio, que le serán administrados en forma de inyección.

#### **Toma de lisinopril cifa con los alimentos y bebidas:**

lisinopril cifa puede ser administrado con o sin alimentos.

#### **Embarazo y lactancia:**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

#### Embarazo:

Debe informar a su médico si piensa que está (o planea quedarse) embarazada. Normalmente su médico le aconsejará que deje de tomar lisinopril cifa antes de quedarse embarazada o nada más saber que está embarazada y le recomendará que tome otro medicamento en lugar de lisinopril cifa. Este medicamento no está recomendado al principio del embarazo, y no debe tomarse si está embarazada de más de 3 meses ya que puede provocar daños graves al bebé si se utiliza después del tercer mes de embarazo.

#### Lactancia:

Informe a su médico si está en periodo de lactancia o va a empezar la lactancia. No se recomienda el uso de lisinopril en madres durante la lactancia, y su médico podría elegir otro tratamiento para usted si desea iniciar la lactancia, especialmente si su bebé es recién nacido o fue prematuro.

#### **Conducción y uso de máquinas:**

Algunas personas pueden sentirse mareadas o cansadas cuando toman este medicamento. Si esto ocurre, no conduzca ni utilice ninguna herramienta o máquina.

Debe esperar a ver cómo le afecta el medicamento antes de intentar realizar estas actividades.

### **3. CÓMO TOMAR lisinopril cifa**

Siga exactamente las instrucciones de administración de lisinopril cifa indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Recuerde tomar su medicamento.

Una vez empiece a tomar lisinopril cifa es posible que su médico realice análisis de sangre. A continuación su médico puede ajustar la dosis para que tome la cantidad adecuada de medicamento.

#### **Toma del medicamento**

- Trague el comprimido con agua.
- Intente tomar sus comprimidos a la misma hora todos los días. No importa que tome el medicamento antes o después de las comidas.
- Continúe tomando lisinopril cifa durante el tiempo que le indique su médico, ya que es un tratamiento a largo plazo. Es importante que continúe tomando el medicamento todos los días.

### **Toma de la primera dosis**

- Tenga especial cuidado cuando tome la primera dosis de lisinopril cinfa o si le aumentan la dosis. Puede provocar una disminución aún mayor de la presión arterial que la que se presentará con las siguientes dosis.
- Este efecto puede hacerle sentirse mareado o con vértigos. Si esto ocurre, puede que tumbarse le ayude. Si esto le preocupa, consulte a su médico lo antes posible.

### **Adultos**

Su dosis depende de su estado y de si está tomando cualquier otro medicamento. Su médico le indicará cuántos comprimidos debe tomar cada día. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.

- Para la presión arterial elevada:

La dosis inicial habitual recomendada es de 10 mg una vez al día.

La dosis habitual a largo plazo es de 20 mg una vez al día.

- Para la insuficiencia cardiaca:

La dosis inicial habitual recomendada es de 2,5 mg una vez al día.

La dosis habitual a largo plazo es de 5 mg hasta un máximo de 35 mg una vez al día.

- Después de un infarto agudo de miocardio (ataque al corazón):

La dosis inicial habitual recomendada es de 5 mg en el primer y segundo día después del infarto, seguidos de 10 mg una vez al día como dosis habitual a largo plazo.

- Complicaciones en la función de los riñones por la diabetes:

La dosis habitual es de 10 mg ó 20 mg una vez al día.

Si es usted anciano, tiene problemas renales o está tomando medicamentos diuréticos, su médico puede indicarle una dosis menor que la dosis habitual.

### **Niños y adolescentes (6 a 16 años de edad) con presión arterial elevada**

lisinopril cinfa no está recomendado en niños menores de 6 años ni en niños con problemas graves de riñón.

- El médico calculará la dosis correcta para el niño. La dosis depende del peso corporal del niño.
- Para niños que pesen entre 20 kg y 50 kg, la dosis habitual de inicio es de 2,5 mg una vez al día.
- Para niños que pesen más de 50 kg, la dosis habitual de inicio es de 5 mg una vez al día.

### **Si toma más lisinopril cinfa del que debiera:**

Si ha tomado más lisinopril cinfa del que debe, consulte inmediatamente a su médico o acuda al hospital más cercano. Los síntomas más frecuentes son: palpitaciones y mareo.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica (teléfono: 91 562 04 20), indicando el producto y la cantidad ingerida.

### **Si olvidó tomar lisinopril cinfa:**

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto lo recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de su siguiente dosis, prescinda de la dosis olvidada.

### **Si interrumpe el tratamiento con lisinopril cinfa:**

No deje de tomar sus comprimidos, aunque se encuentre bien, a menos que se lo indique su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

#### **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, lisinopril cifa puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si presenta alguna de las siguientes reacciones, **deje de tomar lisinopril cifa y acuda a su médico inmediatamente.**

- Reacciones alérgicas graves (poco frecuentes, entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes). Los signos pueden incluir la aparición repentina de:
  - Hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Esto puede dificultar el tragar.
  - Hinchazón grave o repentina de las manos, pies o tobillos.
  - Dificultad para respirar.
  - Picor grave de la piel (con habones).
- Trastornos graves de la piel, como una erupción inesperada y repentina, enrojecimiento o descamación de la piel (muy raro, en menos de 1 de cada 10.000 pacientes).
- Una infección con síntomas tales como fiebre y deterioro grave de su estado general, o fiebre con síntomas de infección local tales como irritación de garganta/faringe/boca o trastornos urinarios (muy raro, en menos de 1 de cada 10.000 pacientes).

#### **Otros posibles efectos adversos:**

##### **Frecuentes (entre 1 y 10 de cada 100 pacientes)**

- Dolor de cabeza.
- Sensación de vértigo o mareo, especialmente al ponerse de pie rápido.
- Diarrea.
- Tos seca persistente.
- Vómitos.
- Trastornos renales (detectados mediante análisis de sangre).

##### **Poco frecuentes (entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes)**

- Cambios de humor.
- Cambio de color de los dedos de las manos y de los pies (azul pálido seguido de enrojecimiento) o entumecimiento o cosquilleo en los dedos de las manos o de los pies.
- Cambios en el sabor de las cosas.
- Somnolencia.
- Sensación de vértigo.
- Dificultad para dormir.
- Accidente cerebrovascular.
- Latido cardíaco rápido.
- Rinitis.
- Náuseas.
- Dolor de estómago o indigestión.
- Erupción cutánea o picor.
- Incapacidad para tener una erección (impotencia).
- Sensación de cansancio o debilidad (falta de fuerza).
- Una disminución importante de la presión arterial que puede ocurrir en personas en las siguientes situaciones: enfermedad coronaria, estrechamiento de la aorta (una arteria del corazón), arterias renales o

válvulas cardíacas; un engrosamiento del músculo cardíaco. Si esto le ocurre, puede sentir vértigo o mareo, especialmente si se pone de pie rápidamente.

- Cambios en los análisis de sangre para determinar el correcto funcionamiento de su hígado y riñones.
- Infarto de miocardio.

#### **Raros (entre 1 y 10 de cada 10.000 pacientes)**

- Confusión.
- Erupción con habones.
- Boca seca.
- Caída del cabello.
- Psoriasis (un problema cutáneo).
- Cambio en el olor de las cosas.
- Desarrollo de mamas en hombres.
- Cambios en algunas células u otros componentes de su sangre. Su médico puede tomar muestras de vez en cuando para comprobar si lisinopril cinfa está afectando a su sangre. Los signos pueden incluir cansancio, piel pálida, irritación de garganta, fiebre, dolor articular y muscular, inflamación de las articulaciones o glándulas o sensibilidad a la luz solar.
- Fallo renal repentino.

#### **Muy raros (en menos de 1 de cada 10.000 pacientes)**

- Sinusitis (sensación de dolor y presión detrás de las mejillas y ojos).
- Jadeos.
- Niveles bajos de glucosa en sangre (hipoglucemia). Los signos pueden incluir sensación de hambre o debilidad, sudoración y latido cardíaco rápido.
- Inflamación de los pulmones. Los signos incluyen tos, falta de aire y fiebre alta.
- Coloración amarilla de la piel o el blanco de los ojos (ictericia).
- Inflamación del hígado. Esto puede provocar una pérdida de apetito, coloración amarilla de la piel y ojos y orina de color oscuro.
- Inflamación del páncreas. Esto provoca dolor de moderado a intenso en el estómago.
- Trastornos graves de la piel. Los síntomas incluyen enrojecimiento, formación de ampollas y descamación.
- Sudoración.
- Disminución de la cantidad de orina o imposibilidad para orinar.
- Insuficiencia hepática.
- Habones.
- Inflamación intestinal.

#### **Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)**

- Síntomas de depresión.
- Desmayos.
- Bajos niveles de sodio en sangre (que puede producir síntomas como cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos).

- Los efectos adversos en niños son, al parecer, comparables a los observados en adultos.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.


## **5. CONSERVACIÓN DE lisinopril cinfa**

No requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

### **Caducidad**

No utilice lisinopril cinfa después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “CAD”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

## **6. INFORMACIÓN ADICIONAL**

### **Composición de lisinopril cinfa:**

- El principio activo es lisinopril dihidrato, que equivale a 5 mg de lisinopril anhidro.
- Los demás componentes son: manitol (E-421), hidrógeno fosfato de calcio dihidrato, almidón de maíz, almidón pregelatinizado, estearato de magnesio, óxido de hierro rojo (E-172) y sílice coloidal anhidra.

### **Aspecto del producto y contenido del envase:**

lisinopril cinfa se presenta en forma de comprimidos ranurados de color rosa. Cada envase contiene 60 comprimidos.

### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación:**

Laboratorios Cinfa, S.A.  
C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta.  
31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-España

**Este prospecto ha sido aprobado en Marzo de 2011.**

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [www.aemps.gob.es/](http://www.aemps.gob.es/)