

**cinfammar 25 mg comprimidos infantil**  
Dimenhidrinato

**COMPOSICIÓN:**

Por comprimido recubierto:

Dimenhidrinato.....25 mg  
Excipientes: hidrógeno fosfato de calcio dihidrato, almidón de maíz, sílice coloidal anhidra, celulosa microcristalina, povidona, talco, estearato de magnesio, hipromelosa, dióxido de titanio, eritrosina, indigotina, óxido-hidróxido de hierro, macrogol 400, macrogol 6000 en c.s.

**PROPIEDADES:**

El dimenhidrinato, además de su acción antihistamínica, tiene la propiedad de prevenir y aliviar la cinetosis, cuadro sintomático debido al movimiento, que se produce con frecuencia en los viajes, caracterizado en general por un estado de mareo, palidez, sudores fríos, salivación, molestias gástricas, náuseas, vómitos, etc.

**INDICACIONES:**

**cinfammar 25 mg comprimidos infantil** está indicado principalmente en la prevención y tratamiento del mareo producido por los viajes en coche, tren, avión, barco, etc.

**POSOLÓGÍA:**

Debe tomarse una dosis aproximadamente media hora antes de salir de viaje y repetir, si es necesario, durante el transcurso del mismo, dejando pasar al menos 4 horas entre una toma y la siguiente.  
Niños de 2 a 8 años: 1/2 comprimido a 1 comprimido.  
Niños de 8 a 12 años: 1 a 2 comprimidos.  
Todas estas dosis se pueden tomar hasta 3 veces en 24 horas.  
Puede facilitarse la ingestión con un poco de agua o de una bebida dulce.

**CONTRAINDICACIONES:**

Glaucoma y trastornos uretro-prostáticos.

**PRECAUCIONES:**

La somnolencia que puede producir dimenhidrinato, y que en muchos casos es deseable, deberá tenerse en cuenta por quienes han de conducir vehículos o manejar máquinas

**ADVERTENCIA:**

**IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES:**

Ingestión simultánea con otros depresores del S.N.C., como barbitúricos y alcohol, puede producir un aumento de los efectos sedantes.  
Sus efectos anticolinérgicos pueden ser potenciados por otros fármacos con acción anticolinérgica (antidepresivos tricíclicos, IMAO, etc.).

**EFFECTOS SECUNDARIOS:**

Somnolencia, sequedad de boca, estreñimiento.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO:**

Las dosis recomendadas y el contenido total del envase hacen poco probable una intoxicación. Una sobredosis puede producir convulsiones y/o un delirio alucinatorio. En tal caso, administrar prudentemente anticonvulsionantes de acción rápida por vía I.M. o I.V. y un lavado gástrico, aunque sea tardío.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica Teléfono 91 562 04 20.

**PRESENTACIONES:**

Envases con 4 y 10 comprimidos recubiertos.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**cinfamar 25 mg comprimidos infantil**  
Dimenhydrinate

**COMPOSITION:**

Per coated tablet

Dimenhydrinate.....25 mg

Excipients: dibasic calcium phosphate, maize starch, colloidal anhydrous silica, microcrystalline cellulose, povidone, talc, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, erythrosine, indigotine, red iron oxide, macrogol 400, macrogol 6000, q.s.

**PROPERTIES:**

Apart from its antihistaminic action, Dimenhydrinate prevents and relieves kinetosis, a symptomatic manifestation caused by movement, which frequently appears while travelling and it is generally characterised by dizziness, paleness, cold sweating, salivation, gastric upsets, nausea, vomiting, etc.

**INDICATIONS:**

cinfamar 25 mg comprimidos infantil is mainly indicated for the prevention and treatment of travel sickness produced during journeys by car, train, plane, ship, etc.

**DOSAGE:**

The dose should be taken approximately half an hour before initiating the journey. When necessary, the dose may be repeated during the journey at intervals of not less than four hours.

Children 2 to 8 years: 1/2 - 1 tablet

Children 8 to 12 years : 1-2 tablets

. These doses may be taken up to 3 times within 24 hours.

The tablets may be better ingested with water or sweet drink.

**CONTRAINDICATIONS:**

Glaucoma and urethral-prostatic problems.

**PRECAUTIONS:**

Drivers and those using machines should note that Dimenhydrinate causes drowsiness, which is desirable in many cases.

**WARNING :**

**NOTICE FOR WOMEN:**

In the event you were or thought to be pregnant, consult your doctor before taking this medicine. Use of medicines during pregnancy may be dangerous for the embryo or foetus and must be supervised by your doctor.

**INCOMPATIBILITIES AND INTERACTIONS:**

Dimenhydrinate may enhance the sedative effects when ingested together with other CNS depressants such as alcohol and barbiturates. Its anticholinergic effects could be enhanced by other medicines with anticholinergic action (tricyclic antidepressants, MAO inhibitors, etc.)

**SIDE EFFECTS :**

Drowsiness, mouth dryness, constipation.

**INTOXICATION AND TREATMENT:**

The recommended dosage and the total content of the package make intoxication unlikely. An overdose may produce convulsions and/or hallucinatory delirium. In that case, rapid-action anti-convulsants should be cautiously administered by intramuscular or intravenous injection and a stomach wash should be carried out even afterwards.

If overdose or accidental ingestion, consult the Toxicology Information Service.

Phone: 91 562 04 20

**PRESENTATION:**

Packages of 4 and 10 coated tablets.

**NON-PRESCRIPTION MEDICINE**

**MEDICINES MUST BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.**