

antihémorroïdal cinfa

COMPOSITION par gramme:

Hydrocortisone acétate	25 mg
Néomycine (sulfate)	3,5 mg
Benzocaïne	15 mg
Acide Tannique	10 mg

Excipients: Parahydroxybenzoate de butyle, 1,7 mg; Parahydroxybenzoate de méthyle, 0,2 mg; cholestérol, 4,8 mg; cire microcristalline, 38,8 mg; vaseline filante, 710,5 mg; vaseline liquide, 189,0 mg.

L'association d'hydrocortisone (corticostéroïde ayant une action topique anti-inflammatoire et antiallergique), de néomycine (antibiotique d'ample spectre), d'acide tannique (astringent, hémostatique) et de benzocaïne (anesthésique, antiprurigineux) permet d'obtenir une formule efficace pour le traitement symptomatique des troubles provoqués par les hémorroïdes.

INDICATIONS:

Hémorroïdes externes et internes, fissures, fistules, ulcères, prurit anal, etc.

POSOLOGIE:

En général, il est recommandé de l'appliquer trois ou quatre fois par jour, en utilisant, si nécessaire, la canule qui accompagne le tube.

CONTRE-INDICATIONS – PRÉCAUTIONS:

Les patients, spécialement ceux qui reçoivent des corticostéroïdes par voie orale ou parentale, et ceux qui ont besoin d'un traitement prolongé, doivent suivre la prescription du médecin.

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive dans les tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

INCOMPATIBILITÉS – INTERACTIONS:

Elles n'ont pas été décrites.

EFFETS SECONDAIRES:

Ils n'ont pas été décrits.

INTOXICATION ET TRAITEMENT:

Il n'y a pas d'expérience clinique d'intoxications graves.

PRÉSENTATION:

Tube de 30 g avec canule adaptable.

GARDEZ LES MÉDICAMENTS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TITULAIRE/COMMERCIALISÉ PAR:

LABORATOIRES CINFA, S.A.

Olaz Chipi, 10. P.I. ARETA. 31.620 HUARTE-PAMPLONA. Espagne.



Laboratorios Cinfa, S.A.

Olaz Chipi 10

Huarte Pamplona

ESPAÑE-SPAIN