

# bactopumon

## COMPOSICION:

Cada 5 ml contienen:

Sulfametoxazol (DCI) .....	400,0 mg
Trimetoprima (DCI) .....	80,0 mg
Extracto fluido de Bálsamo de Tolú .....	75,0 mg
Bromhexina (DCI) CIH .....	2,2 mg
Excipientes: Sacarosa, 2,0 g; Etanol, 70,5 mg; Sacarina sódica, 2,0 mg; Celulosa microcristalina, Esencia de fresa, Goma xantana, Polisorbato 80, Rojo ponceau, Dimetilpolisiloxano y Agua desmineralizada.	

## PROPIEDADES:

La asociación de una sulfamida, Sulfametoxazol, y una diaminopirimidina, Trimetoprima, da lugar a un medicamento eficaz frente a una gran variedad de gérmenes causantes de diferentes enfermedades. Su unión a Bálsamo de Tolú (expectorante) y a Bromhexina (mucolítico) permite ejercer una acción etiológica y sintomática en los procesos broncopulmonares.

## INDICACIONES: Infecciones del aparato respiratorio.

Bronquitis aguda y reagudización de la bronquitis crónica, neumonía, infecciones del oído medio y sinusitis.

Tratamiento y prevención de neumonía por *Pneumocystis carinii*.

Cualquiera de las infecciones citadas debe ser diagnosticada y su tratamiento establecido por el médico, por lo que no debe, en ningún caso, utilizarse este medicamento por propia iniciativa.

## POSOLOGIA. MODO DE EMPLEO:

Las dosis prescritas por el médico no deben modificarse ni interrumpirse. Como regla general, puede darse la siguiente pauta para la utilización del medicamento:

- Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml, 2 veces al día.

- Niños de 6 a 12 años: 5 ml, 2 veces al día.

- Niños de 6 meses a 6 años: 2,5 ml, 2 veces al día.

- Niños de 2 meses a 5 meses: 1,25 ml, 2 veces al día.

Es conveniente beber suficiente líquido durante el tratamiento.

## CONTRAINDICACIONES:

- Este medicamento puede resultar contraindicado en personas sensibles a alguna de las sustancias que lo componen.

- No debe utilizarse en niños prematuros o menores de 2 meses.

- No debe utilizarse sin una supervisión adecuada en desórdenes hematológicos graves.

## PRECAUCIONES:

- Debe ser empleado con precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática, o en los afectados por desnutrición o alcoholismo.

- Se empleará con precaución en pacientes con alergias graves o asma bronquial.

- Se debe poner especial cuidado en tratar con este medicamento a pacientes ancianos.

- Evitar la exposición excesiva al sol o el uso de lámparas solares.

**Embarazo y Lactancia:** La posible utilización de este medicamento en los períodos de embarazo y lactancia será igualmente valorada y establecida por el médico.

- Por contener etanol como excipiente, puede ser causa de riesgo en pacientes con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, y en mujeres embarazadas y niños.

## ADVERTENCIA:

Cada 5 ml de este medicamento contienen 2 g de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos.

## INCOMPATIBILIDADES:

Este medicamento puede tener una influencia sobre la acción de otros que se estén tomando simultáneamente; por lo que, si está usted en tratamiento para diabetes, epilepsia, o con fármacos con efecto sobre la coagulación de la sangre, deberá comunicarlo a su médico.

## EFFECTOS SECUNDARIOS:

Este medicamento es, generalmente, bien tolerado por la mayoría de los pacientes.

No obstante, en determinados casos, pueden producirse náuseas, vómitos, diarrea o dificultades respiratorias. Más raramente, rojeces en la piel y, en pacientes de edad avanzada, erupciones cutáneas de mayor gravedad.

Si aparece cualquiera de los síntomas citados, se deberá consultar inmediatamente al médico.

## INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO:

La toma accidental de este medicamento, o la sobredosificación, debe ser inmediatamente comunicada al médico, indicando la cantidad de producto ingerido.

Los síntomas de sobredosificación más frecuentes son vómitos, náuseas, vértigo y confusión.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: (91) 562 04 20

## PRESENTACION:

Envase con 100 ml de suspensión.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

CON RECETA MÉDICA