

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
ibufen suspension buvable
ibuprofène 100 mg/5 ml

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement:

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que **ibufen suspension buvable** et dans quel cas est-il utilisé.
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **ibufen suspension buvable**.
3. Comment prendre **ibufen suspension buvable**.
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver **ibufen suspension buvable**.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE **ibufen suspension buvable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ**

L'ibuprofène appartient au groupe de médicaments dénommés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Ce médicament est indiqué dans le traitement de: douleur d'intensité légère à modérée, fièvre et arthrite rhumatoïde juvénile.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE **ibufen suspension buvable**

Ne prenez jamais **ibufen suspension buvable:** Si vous êtes allergique à l'ibuprofène ou à l'un des excipients d'**ibufen suspension buvable**. Si vous avez souffert des réactions allergiques de type asthmatique, rhinite ou urticaire lors d'une prise d'aspirine ou d'un autre médicament appartenant au groupe des anti-inflammatoires nonstéroïdiens. Si vous avez un ulcère gastro-intestinal ou une hémorragie gastro-intestinale. Si vous êtes atteint d'une maladie inflammatoire intestinale, telle que la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Si vous souffrez d'insuffisance hépatique ou rénale grave. Si vous souffrez de troubles de la coagulation sanguine. Si vous êtes enceinte (voir rubrique « Grossesse »).

Faites attention avec **ibufen suspension buvable:** Si vous avez été atteint d'une maladie gastro-intestinale, telle qu'un ulcère ou maladie inflammatoire gastro-intestinale. Si vous constatez un trouble digestif, douleur ou saignement, vous devez suspendre le traitement et consulter votre médecin. Si vous souffrez d'une maladie hépatique ou rénale. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension. Si vous souffrez d'asthme bronchique ou toute autre maladie allergique.

Prise d'autres médicaments: Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne prenez pas d'ibuprofène avec d'autres antalgiques sans consulter votre médecin. Les patients traités de façon continue avec d'autres médicaments (anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, méthotrexate, lithium, mifépristone, digoxine et glycosides cardiaques, antihypertenseurs et diurétiques, phénytoïne, probénécide, sulfapyrazone, antidiabétiques Toraxa, corticoïdes, zidovudine) doivent consulter leur médecin avant de prendre ce médicament ou tout autre antalgique.

Grossesse et allaitement: Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. L'ibuprofène ne doit pas être administré pendant la grossesse, notamment pendant le troisième trimestre, car il est susceptible d'avoir des effets délétères sur le fœtus. Bien que les quantités d'ibuprofène qui passent dans le lait maternel soient faibles, il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en traitement prolongé pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines: Si vous ressentez des étourdissements, des vertiges, des troubles visuels ou tout autre symptôme pendant l'utilisation de ce médicament, vous ne devez ni conduire ni utiliser de machines. Si vous ne prenez qu'une dose d'ibuprofène ou pendant une courte période, les précautions particulières ne sont pas nécessaires.

Informations importantes concernant certains composants d'ibufen suspension buvable**:**

Du fait qu'il contient du glycérol comme excipient, ce médicament peut être nocif à doses élevées. Il peut causer des céphalées, des troubles gastriques et des diarrhées. Le fait qu'il contient du benzoate de sodium (E 211) comme excipient peut irriter légèrement les yeux, la peau et les muqueuses. Le risque de jaunisse (ictère) peut également augmenter chez les nouveau-nés. Ce médicament contient du sirop de maltitol: si vous souffrez d'intolérance quelconque à certains sucres, veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE **ibufen suspension buvable**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est:

6-12 ans	1-3 ans	4-6 ans	7-9 ans	10-12 ans	+12 ans
7,7-9 Kg (approx.)	10-15 Kg (approx.)	16-20 Kg (approx.)	21-29 Kg (approx.)	30-40 Kg (approx.)	+40 Kg
					
3-4 par jour par jour	3 par jour par jour	3 par jour par jour	3 par jour par jour	3 par jour par jour	3-4 par jour par jour

ibufen suspension buvable est une suspension administrée par voie orale. Afin de doser correctement le produit, l'emballage contient une seringue graduée de 5 ml pour l'administration orale. Veuillez nettoyer et sécher la seringue après chaque utilisation. En cas de sensibilité gastrique, veuillez prendre ce médicament avec les repas. **Personnes âgées:** Généralement, aucune modification particulière de la posologie n'est nécessaire. **Patients atteints d'insuffisance rénale ou hépatique:** Votre médecin ajustera la posologie.

Si vous avez pris plus d'ibufen suspension buvable** que vous n'auriez dû:**

Si vous avez pris plus d'ibufen suspension buvable que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Les symptômes les plus fréquents en cas de surdosage sont: douleur abdominale, nausées, vomissements, somnolence, céphalée, mouvements oculaires involontaires, bourdonnements d'oreilles et manque de coordination des mouvements musculaires. En de rares occasions, des symptômes plus graves peuvent se produire, tels que des hémorragies gastro-intestinales, une baisse de tension artérielle, l'apparition de convulsions et de troubles respiratoires. En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez vous rendre à un dispensaire en précisant le médicament et la quantité ingérée.

Si vous avez oublié de prendre **ibufen suspension buvable:** Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, **ibufen suspension buvable** peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables des médicaments tels que l'ibuprofène sont plus fréquents chez les personnes âgées de plus de 65 ans. L'incidence des effets indésirables est moindre lors de traitements sur une courte période et si la dose quotidienne est inférieure à la posologie maximum conseillée.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés:

Gastro-intestinaux:

- Très fréquents:** troubles digestifs, diarrhée.
- Fréquents:** nausées, vomissements, douleur abdominale.
- Peu fréquents:** hémorragie, ulcères à l'estomac ou au duodénum, ulcères de la bouche.
- Rares:** perforation gastrique ou intestinale, flatulence, constipation, inflammation de l'œsophage et ulcères ou inflammation de l'intestin.

Cutanés et réactions allergiques:

- Fréquents:** éruptions cutanées.
- Peu fréquents:** rougeurs cutanées, démangeaisons ou gonflement de la peau, gonflement des lèvres, de la langue ou du visage, sécrétion nasale et difficulté respiratoire.
- Rares:** réactions allergiques graves (choc anaphylactique).
- Très rares:** brusque apparition de démangeaisons intenses ou d'ampoules sur la peau, douleur articulaire et fièvre (lupus érythémateux), perte de cheveux, réactions cutanées dues à la lumière.

Du système nerveux central:

- Fréquents:** fatigue ou somnolence, céphalées, étourdissements, vertige.
- Peu fréquents:** insomnie, anxiété, inquiétude, troubles visuels, bourdonnements ou sifflements d'oreilles.
- Rares:** désorientation ou confusion, agitation, irritabilité, dépression, vision trouble ou anormale et difficultés auditives.
- Très rares:** méningite aseptique.

Du sang:

- Très rares:** prolongation du temps de saignement, diminution des globules

blancs (pouvant manifester par l'apparition d'infections fréquentes accompagnées de fièvre, de frissons ou de mal de gorge), diminution des globules rouges (pouvant se manifester par des difficultés respiratoires et une pâleur de la peau).

Cardiovasculaires:

Gonflement des extrémités ou accumulation de liquide dans les bras ou les jambes (plus probable chez les sujets ayant une tension artérielle élevée ou atteints de troubles rénaux). Insuffisance cardiaque ou tension artérielle élevée (hypertension), notamment chez les patients âgés.

Des reins: Affection ou insuffisance rénale.

Du foie: Rares: hépatite (inflammation du foie) et ictère (jaunisse).

Autres: Aggravation des inflammations lors de processus infectieux. Aucune réaction allergique grave due à l'ibuprofène n'a été rapportée jusqu'à maintenant, bien que ces réactions ne peuvent être écartées. Les manifestations de ce type de réactions vont de la fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale, maux de tête d'intensité élevée et persistants, nausées, vomissements, gonflement du visage, de la langue et de la gorge, difficultés respiratoire, asthme, palpitations, hypotension jusqu'à la situation de choc.

Dès l'apparition de l'un quelconque des effets indésirables cités ci-dessus, veuillez suspendre le traitement et consulter immédiatement votre médecin: Réactions allergiques telles qu'éruptions cutanées, gonflement du visage, sifflement dans la poitrine ou difficultés respiratoires. Vomissements de sang ou d'aspect similaire au marc de café. Sang dans les selles ou diarrhée sanguinolente. Maux d'estomac de forte intensité. Ampoules ou desquamation importante de la peau. Céphalée intense ou persistante. Jaunisse (ictère). Signes d'hypersensibilité grave (voir plus haut dans cette même rubrique). Gonflement des extrémités ou accumulation de liquides dans les bras ou les jambes. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER **ibufen suspension buvable**

Pas de précautions particulières de conservation. Ne pas utiliser **ibufen suspension buvable** après la date de péremption indiquée sur la boîte.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient **ibufen suspension buvable:** La substance active est l'ibuprofène. Chaque 5 ml de suspension buvable contient 100 mg d'ibuprofène. Les autres composants sont: glycérol, sirop de maltitol, cellulose microcristalline, gomme xanthane, acide citrique anhydre, citrate de sodium, benzoate de sodium (E 211), polysorbate 80, saccharine de sodium, essence d'orange et eau purifiée.

Qu'est-ce que **ibufen suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur:** **ibufen suspension buvable** est une suspension buvable de couleur blanche. Il se présente en flacons de 100 ml et 200 ml avec une seringue graduée de 5 ml.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant:

Laboratorios Cínta, S.A. C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta. 31620 Huarte - Pamplona (Navarra)-Espagne.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2006.