

gastribien

ANTIÁCIDO DE ACCIÓN PROLONGADA

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene:

Algeldrato (hidróxido de aluminio, gel seco) 300 mg

Trisilicato de magnesio 200 mg

Excipientes: Sacarina Sódica, 1 mg; Sacarosa, 234 mg; Almidón de maíz; Estearato de magnesio; Fosfato cálcico dibásico dihidrato; Mentol; Palmito-estearato de glicerol; Polividona; Aroma.

Los síndromes gástricos más comunes son la dispepsia o indigestión y la úlcera gastroduodenal o úlcera péptica. En ambos casos están alteradas las funciones gástricas y una de las alteraciones más comunes es el aumento de secreción, dando lugar a un jugo gástrico demasiado ácido que interesa corregir. La reducción de la acidez favorece la curación de la úlcera, alivia sus síntomas, especialmente el dolor, y esto último se aplica también a la hiperclorhidria observada en procesos dispépticos.

GASTRIBIEN incluye en su fórmula dos antiácidos gástricos locales (Algeldrato y Trisilicato de magnesio) que, además de su eficacia como neutralizantes de la secreción ácida, reducen al mínimo la posibilidad de efecto “rebote” y forman una capa sobre la mucosa gastrointestinal, especialmente sobre el cráter ulceroso, que la protege del ataque del ácido clorhídrico y la pepsina.

INDICACIONES:

Trastornos gástricos con hiperacidez: Gastralgias, dispepsias, etc...

POSOLOGÍA:

Salvo prescripción facultativa, se puede dar como orientación la siguiente: 1-2 comprimidos, 3 veces al día, una a dos horas después de las comidas.

Tómense los comprimidos masticándolos en la boca antes de tragarlos o bien, si se prefiere, disgregándolos previamente en un vasito de agua.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia renal.

ADVERTENCIA:

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

INCOMPATIBILIDADES:

El Algeldrato (hidróxido de aluminio) dificulta la absorción de tetraciclinas, isoniazida y digoxina por vía oral, por lo que, si se está en tratamiento con alguna de ellas, no debe administrarse GASTRIBIEN conjuntamente, sino espaciar las tomas.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede provocar diarrea o estreñimiento.

No deberá hacerse una terapia intensiva o prolongada sin control médico.

INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO:

No se prevé que GASTRIBIEN produzca fenómenos tóxicos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACIONES:

Envases con 30 y 60 comprimidos.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS