

# gastribien

ANTIÁCIDO DE ACCIÓN PROLONGADA

---

## COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene:

Algeldrato (hidróxido de aluminio, gel seco) ..... 300 mg

Trisilicato de magnesio ..... 200 mg

Excipientes: Sacarina Sódica, 1 mg; Sacarosa, 234 mg; Almidón de maíz; Estearato de magnesio; Fosfato cálcico dibásico dihidrato; Mentol; Palmito-estearato de glicerol; Polividona; Aroma.

---

Los síndromes gástricos más comunes son la dispepsia o indigestión y la úlcera gastroduodenal o úlcera péptica. En ambos casos están alteradas las funciones gástricas y una de las alteraciones más comunes es el aumento de secreción, dando lugar a un jugo gástrico demasiado ácido que interesa corregir. La reducción de la acidez favorece la curación de la úlcera, alivia sus síntomas, especialmente el dolor, y esto último se aplica también a la hiperclorhidria observada en procesos dispépticos.

GASTRIBIEN incluye en su fórmula dos antiácidos gástricos locales (Algeldrato y Trisilicato de magnesio) que, además de su eficacia como neutralizantes de la secreción ácida, reducen al mínimo la posibilidad de efecto "rebote" y forman una capa sobre la mucosa gastrointestinal, especialmente sobre el cráter ulceroso, que la protege del ataque del ácido clorhídrico y la pepsina.

---

## INDICACIONES:

Trastornos gástricos con hiperacidez: Gastralgias, dispepsias, etc...

---

## POSOLOGÍA:

Salvo prescripción facultativa, se puede dar como orientación la siguiente: 1-2 comprimidos, 3 veces al día, una a dos horas después de las comidas.

Tómense los comprimidos masticándolos en la boca antes de tragarlos o bien, si se prefiere, disgregándolos previamente en un vasito de agua.

---

## CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia renal.

---

## ADVERTENCIA:

### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

---

## INCOMPATIBILIDADES:

El Algeldrato (hidróxido de aluminio) dificulta la absorción de tetraciclinas, isoniazida y digoxina por vía oral, por lo que, si se está en tratamiento con alguna de ellas, no debe administrarse GASTRIBIEN conjuntamente, sino espaciar las tomas.

---

## EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede provocar diarrea o estreñimiento.

No deberá hacerse una terapia intensiva o prolongada sin control médico.

---

## INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO:

No se prevé que GASTRIBIEN produzca fenómenos tóxicos.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica.

Teléfono 91 562 04 20.

---

## PRESENTACIONES:

Envases con 30 y 60 comprimidos.

SIN RECETA MÉDICA

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# gastribien

LONG ACTING ANTACID

**COMPOSITION:**

	Per Tablet
Algedrate (aluminium hydroxide dry gel).....	300 mg
Magnesium Trisilicate .....	200 mg
Excipients: Saccharin sodium, 1 mg; Sucrose, 234 mg; Maize starch; Essence; Dibasic calcium phosphate dihydrate; Magnesium stearate; Menthol; Glyceryl palmitate/stearate; Polyvidone.	

The most frequent gastric syndromes are dyspepsia or indigestion, and gastroduodenal or peptic ulcer; in both cases there are alterations of the gastric functions. A common alteration is that of increase of secretion resulting in hyperacidity of the gastric juice, a condition which should be treated. The reduction of acidity favours the healing of ulcer and relieves the symptoms, specially pain. GASTRIBIEN contains two local gastric antacids (Algedrate and magnesium trisilicate) effective as neutralizers of acid secretion. They also reduce the possibility of a rebound effect and form a layer over the gastrointestinal mucosa specially the ulcer cavity, thus protecting it from the actions of hydrochloric acid and pepsin.

**INDICATIONS:**

Gastric upsets accompanied by hyperacidity; gastralgias, dyspepsias, etc.

**DOSAGE:**

Except in the case of medical prescription, the following indications may be followed: 1-2 tablets 3 times a day, taken one or two hours after meals. The tablets should be chewed before swallowing or, if preferred, broken up and taken in a small glass of water.

**CONTRAINDICATIONS:**

Renal impairment.

**WARNING:**

**IMPORTANT FOR WOMEN :**

As with any drug, if you are pregnant or nursing a baby, seek the advice of a health professional before using this product.

**INCOMPATIBILITIES:**

Algedrate (aluminium hydroxide) taken orally impedes the absorption of tetracyclines, isoniazid and digoxin. Gastribien should be taken separately, not simultaneously, with these drugs.

**SIDE EFFECTS:**

Diarrhea or constipation may occur. Intensive or prolonged treatment should not be administered without medical control.

**INTOXICATION AND TREATMENT:**

Toxic effects are unlikely. If overdose or accidental ingestion, consult the Toxicology Information Service. Phone: 91 562 04 20.

**PRESENTATION:**

Packages of 30 and 60 tablets.



**laboratorios  
cinfa, s.a.**

Olaz - Chipi, 10  
HUARTE - PAMPLONA  
Navarra • SPAIN



NONPRESCRIPTION MEDICATION

**MEDICINES SHOULD BE KEPT OUT  
OF CHILDREN'S REACH**