

carbomuc enfants

Carbocistéine 2%

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice: vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets indésirables comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que **carbomuc enfants** est et dans quel cas est-il utilisé.
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **carbomuc enfants**.
3. Comment prendre **carbomuc enfants**.
4. Quels sont les effets indésirables éventuels.
5. Comment conserver **carbomuc enfants**.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE carbomuc enfants EST ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

carbomuc enfants est un médicament qui agit en réduisant la viscosité des mucosités, en les fluidifiant, ce qui facilite son élimination.

Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches, en particulier lors des bronchites aiguës.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE carbomuc enfants**Ne prenez jamais carbomuc enfants:**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la carbocistéine ou à l'un des autres composants de ce médicament (voir la rubrique **Informations importantes concernant certains composants**).
- Si vous êtes atteint d'un ulcère actif de l'estomac ou du duodénum.
- Si vous êtes atteint d'asthme ou de toute autre maladie respiratoire grave.

Faites attention avec carbomuc enfants:

- Si vous avez des antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

Prise simultanée d'autres médicaments:

Ne prenez pas **carbomuc enfants** en même temps que d'autres médicaments antitussifs (pour la toux) ou visant à réduire les sécrétions bronchiales.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement:

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Important pour les femmes:

Si vous êtes enceinte ou suspectez de l'être, consultez votre médecin avant de prendre ce médicament. La prise de médicaments pendant la grossesse peut être dangereuse pour l'embryon ou le fœtus et ne doit s'effectuer que sous la surveillance d'un médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Il est recommandé d'utiliser ce médicament avec prudence chez les patients dont l'activité nécessite une attention soutenue et ayant observé des effets indésirables tels que des étourdissements et des vertiges suite à la prise de ce médicament.

Informations importantes concernant certains composants de carbomuc enfants:

Ce médicament contient du Jaune orangé (E-110). Il peut provoquer des réactions de type allergique, y compris de l'asthme chez des patients allergiques à l'acide acétylsalicylique.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle. Il peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ce médicament contient du maltitol. Si vous êtes atteint d'une intolérance héréditaire au fructose, veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE carbomuc enfants

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les doses habituelles sont les suivantes:

Enfants de 2 à 5 ans: administrer 5 ml (100 mg), deux fois par jour.

Enfants de plus de 5 ans: administrer 5 ml (100 mg), trois fois par jour.

Enfants de moins de 2 ans: l'administration de **carbomuc enfants** n'est pas recommandée chez les enfants de moins de 2 ans.

Il est recommandé de boire abondamment pendant la journée.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent au bout de 5 jours de traitement ou en cas de fièvre, d'éruptions cutanées, de maux de tête persistants ou de maux de gorge, veuillez consulter votre médecin.

Si vous avez pris plus de carbomuc enfants que vous n'auriez dû:

Si vous avez pris plus de **carbomuc enfants** que vous n'auriez dû, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien en indiquant le nom du médicament et la quantité ingérée.

Si vous oubliez de prendre carbomuc enfants:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, **carbomuc enfants** peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les effets gastro-intestinaux tels que: malaises gastriques, nausées, vomissements et diarrhée. Dans certains cas, il peut être utile de réduire la dose administrée.

Des effets indésirables plus rares tels que: hémorragie gastro-intestinale, maux de tête, vertiges, éruptions cutanées et réactions d'hypersensibilité ont également été signalés.

Quelques cas très rares de bronchospasme et d'érythème fixe médicamenteux ont également été décrits.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER carbomuc enfants

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**Que contient carbomuc enfants:**

- 5 ml de solution contiennent 100 mg de carbocistéine comme substance active.
- Les autres composants sont: maltitol liquide (E-965), hydroxyde de sodium (E-524), citrate de sodium (E-331), propylène glycol (E-1520), hydroxyéthylcellulose, acide citrique monohydrate, parahydroxybenzoate de méthyle (sel de sodium), saccharine de sodium, arôme d'orange, parahydroxybenzoate de propyle (sel de sodium), jaune orangé (E-110), eau purifiée.

Qu'est-ce que carbomuc enfants et contenu de l'emballage extérieur:

carbomuc enfants est une solution orale. Chaque flacon contient 125 ml de solution orale et un verre doseur.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant:

Laboratorios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10. Polígono Industrial Areta
31620 Huarte-Pamplona (Navarre), Espagne