# Atorcor 80 mg film-coated tablets

Atorvastatin

## Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.

- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

#### What is in this leaflet

- 1. What Atorcor 80 mg tablets is and what it is used for
- 2. What you need to know before you take Atorcor 80 mg tablets
- 3. How to take Atorcor 80 mg tablets
- 4. Possible side effects
- 5. How to store Atorcor 80 mg tablets
- 6. Contents of the pack and other information

## 1. What Atorcor 80 mg tablets is and what it is used for

Atorvastatin is a member of the drug class known as statins, which are lipid (fat) regulating medicines.

Atorcor is used to reduce fatty substances such as cholesterol and triglycerides in the blood, when a low-fat diet and lifestyle changes on their own have been unsuccessful.

If you have a high risk of heart disease, Atorcor can also help to reduce this risk, even if your cholesterol levels are normal. During treatment, you should maintain a standard low-cholesterol diet.

## 2. What you need to know before you take Atorcor 80 mg tablets

## Do not take Atorcor 80 mg tablets:

- If you are hypersensitive (allergic) to atorvastatin or to any similar drug used to lower blood fat levels or to any of the other components of this drug (please see section 6).
- If you currently have or have ever had a disease which affects the liver.
- If you currently have or have ever had anv unexplained abnormal blood tests for liver
- If you are a woman able to have children and not using reliable contraception
- If you are pregnant or trying to become pregnant.
- If you are breast-feeding.

#### Warnings and precautions: Atorcor may not be suitable for you if you currently have or have ever had any of the

following conditions: • If you have had a previous stroke with

- bleeding into the brain, or have small pockets of fluid in the brain from previous strokes.
- If you have kidney problems.
- If you have an under-active thyroid gland (hypothyroidism) If you have had repeated or unexplained
- muscle aches or pains, a personal history or family history of muscle problems. If you have had previous muscular
- problems during treatment with other drugs to reduce fatty substances (e.g. another statin or fibrates).
- If you regularly drink a large amount of alcohol.
- If you are over 70 years of age. If you have a history of liver disease.

#### Check with your doctor or pharmacist before taking Atorcor

• If you have severe respiratory failure In any of these cases, your doctor will need to carry out a blood test before and possibly during your treatment with Atorcor to predict the risk of muscle-related side effects. The risk of suffering muscle-related adverse effects e.g. rhabdomyolysis is known to increase when certain medicines are taken

## at the same time (please see section 2). Taking other medicines

There are some medicines that may change the effect of atorvastatin or their effect may be changed by atorvastatin. This type of interaction could make one or both of the medicines less effective. Alternatively it could increase the risk or severity of sideeffects, including the important muscle wasting condition known as rhabdomyolysis described in Section 4:

- Drugs used to regulate your immune system, e.g. cyclosporine.
- Certain antibiotics or anti-fungal drugs, eg erythromycin clarithro telithromycin, ketoconazole, itraconazole, voriconazole, fluconazole, posaconazole, rifampin, fusidic acid.
- Other drugs used to regulate fat levels, e.g. gemfibrozil, other fibrates, colestipol.
- Some calcium channel blockers used for treating angina or high blood pressure, e.g. amlodipine, diltiazem; drugs used to regulate your heart rhythm, e.g. digoxin, verapamil, amiodarone.
- Protease inhibitors used to treat HIV infection, e.g. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, etc
- Other drugs known to interact with **Atorcor** include ezetimibe (which lowers cholesterol), warfarin (used to reduce blood coagulation), oral contraceptives stiripentol (an anti-convulsant for epilepsy) cimetidine (used for heartburn and peptic ulcers), phenazone (a painkiller) and antacids (indigestion products containing
- aluminium or magnesium). Medicines obtained without a prescription: St John's Wort.

Always inform your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, even medicines obtained without prescription, as they may interact with Atorcor.

Atorcor 80 mg tablets with food and drink Please see section 3 for instructions on how to take Atorcor.

## Please note the following: Alcohol:

Avoid taking large quantities of alcohol while you are taking this medicine. Please see section 2 for further details.

## Grapefruit juice:

Do not take more than one or two small glasses of grapefruit juice per day because large quantities of grapefruit juice can change the effects of Atorcor.

## Pregnancy and breast-feeding

Do not take Atorcor if you are pregnant think you may be pregnant or are trying to become pregnant. Do not take **Atorcor** if you are able to become

pregnant unless you use reliable contraceptive measures. Atorcor is not recommended for women

during breast-feeding.

Atorcor has not been proven to be safe during pregnancy and lactation. Consult your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine. Driving and using machines

## Normally this medicine does not affect your

ability to drive or operate machines. However, do not drive if this medicine affects your driving capacity. Do not operate tools or machinery if your ability to use them is affected by this drug.

## Important information about some of the components of Atorcor 80 mg tablets

This medicine contains lactose and sucrose. If your doctor has indicated that you suffer from intolerance to some sugars, ask him/her before taking this medicine.

## 3. How to take Atorcor 80 mg tablets

Before starting treatment, your doctor will place you on a low-cholesterol diet, which you should maintain also during therapy with Atorcor.

The usual starting dose of Atorcor is 10 mg daily. Your doctor may increase this dose if necessary. Your doctor will adjust the dose every 4 weeks or more. The maximum dose of Atorcor is 80 mg once daily.

Unless your doctor states otherwise, Atorcor tablets should be swallowed whole with a sufficient amount of liquid (a glass of water) and can be taken at any time of day, with or without food.

Always take Atorcor exactly as your doctor has told you and follow the corresponding dietary recommendations you have been given. Ask your doctor or pharmacist if you are not sure.

Your doctor will decide on the duration of your **Atorcor** treatment.

Please ask your doctor if you think that the effect of Atorcor is too strong or too weak.

#### If you take more Atorcor 80 mg tablets than vou should

In case of overdose or accidental intake,

## notify your doctor or pharmacist immediately.

If you forget to take Atorcor 80 mg If you forget to take a dose, take the next dose at the corresponding time.

#### Do not take a double dose to make up for the missed dose.

If you stop taking Atorcor 80 mg If you have any further questions on the use of this product or wish to stop your treatment, please ask your doctor or pharmacist.

## 4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets

If you believe that any of the side effects that you experience are serious or if you notice any side effect not mentioned in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist

- Rare: affects 1 to 10 users in 10.000: • Serious allergic reaction which causes swelling of the face, tongue and throat that can cause great difficulty in breathing.
- Serious illness with severe peeling and swelling of the skin, blistering of the skin, mouth, eyes genitals and fever. Skin rash with pink-red blotches especially on palms
- of hands or soles of feet which may blister. Muscle weakness, tenderness or pain and particularly, if at the same time, you feel unwell or have a high temperature it may be caused by an abnormal muscle breakdown which can be life-threatening
- and lead to kidney problems. Very rare: affect less than 1 user in 10,000: If you experience problems with
- unexpected or unusual bleeding or bruising, this may be suggestive of a liver complaint. You should consult your doctor as soon as possible.

#### Other possible side effects with Atorcor: Common side effects (affects 1 to 10 users in 100) include:

- inflammation of the nasal passages, pain in the throat, nose bleed
- allergic reactions
- increases in blood sugar levels (if you have diabetes continue careful monitoring of your blood sugar levels), increase in blood creatine kinase
- headache nausea, constipation, wind, indigestion, diarrhoea
- joint pain, muscle pain and back pain

 blood test results that show your liver function can become abnormal Uncommon side effects (affects 1 to 10 users in 1000) include:

- anorexia (loss of appetite), weight gain, decreases in blood sugar levels (if you have diabetes you should continue careful monitoring of your blood sugar levels)
- having nightmares, insomnia dizziness, numbness or tingling in the fingers and toes, reductions of sensation to pain or touch, change in sense of taste. loss of memory blurred vision
- ringing in the ears and/or headvomiting, belching, abdominal pain upper
- and lower, pancreatitis (inflammation of the pancreas leading to stomach pain) hepatitis (liver inflammation) • rash, skin rash and itching, hives, hair loss
- neck pain, muscle fatigue
  fatigue, feeling unwell, weakness, chest
- pain, swelling especially in the ankles (oedema), raised temperature

• urine tests that are positive for white blood Rare side effects (affects 1 to 10 users in

- 10,000) include: visual disturbance
- · unexpected bleeding or bruising cholestasis (yellowing of the skin and whites of the eyes)
- tendon injury

Very rare side effects (affects less than 1 user in 10,000) include:

- an allergic reaction symptoms may include sudden wheezing and chest pain or tightness, swelling of the eyelids, face, lips, mouth, tongue or throat, difficulty breathing, collapse
- hearing loss
- gynecomastia (breast enlargement in men and women)

Possible side effects reported with some statins (medicines of the same type):

- Sexual difficulties
- Denression

 Breathing problems including persistent cough and/or shortness of breath or fever If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

## 5. How to store Atorcor 80 mg tablets

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not store above 25°C.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the container after "EXP". The expiry date refers to the last day of that month.

Do not use this medicine if you notice visible

signs of deterioration. Do not throw away any medicine via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

## 6. Contents of the pack and other information

What Atorcor 80 mg tablets contains The active substance is atorvastatin calcium. Each tablet contains 80 mg of atorvastatin.

- The other ingredients are: Lactose monohydrate
- Magnesium stearate
- Sodium laurylsulfate Microcrystalline cellulose
- · Colloidal anhydrous silica Butvlhvdroxvanisol
- Crospovidone Sodium hydrogen carbonate
- Sucrose
- Sorbitan tristearate
- Macrogol stearate 40 Dimethicone
- 2-bromo-2-nitropropane-1.3-diol
- Hypromellose Titanium dioxide

### Macrogol 4000 What atorvastatin 80 mg tablets looks like

Film-coated tablets

Oblong, biconvex, scored, fractionable, white-coloured tablets. Atorcor 80 mg is supplied in packages containing 28 tablets, in 7-tablets blister

#### packs. Marketing Authorisation Holder and Manufacturer

Laboratorios Cinfa, S.A. C/ Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta 31620 Huarte-Pamplona (Navarre) - Spain

Other packaging configurations: Atorcor 10 mg film-coated tablets Atorcor 20 mg film-coated tablets Atorcor 40 mg film-coated tablets Date of last revision: December 2012

This is medicament

- A medicament is a product which affects
your health, and its consumption contrary

- your learn, and its Consumption contrary to instruction is dangerous for you.

  Strictly follow the doctor's prescription, the method of use, and the instruction of the pharmacist who sold the medicament.

  The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interrupt the treatment period without consulting your physician.

  - Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.

  - Keep medication out of reach & sight of
- Council of Arab Health Ministers and Union of Arab Pharmacists.

السكر في الدم (إذا كان لديك مرض السكري يجب أن تستمر في الرصد الدقيق لمستويات السكر في الدم)

أخذت في الآونة الأخيرة أي أدوية أخرى، حتى الأدوية - الدوخة، وخدر أو وخز في أصابع اليدين والقدمين، إحتفظ بهذه النشرة، ربما تحتاج إلى قراءتها مرة ثانية. المتاحة بدون وصفة طبية، لأنها قد تتفاعل مع أتوركور وخفض الإحساس للألم أو لمسة، تغيير في حاسة التذوق، وفقدان الذاكرة

- طنين في الأذنين و / أو الرأس

- القيء، والتجشؤ، وألم في البطن العلوية والسفلية، والتهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس مما يؤدي إلى

- التهاب الكبد. - الطفح الجلدي، وحكة الطفح الجلدي، وفقدان

وتورم الكاحلين ارتفاع درجة الحرارة الآثار الجانبية نادرة (يؤثر على ١ إلى ١٠ في١٠,٠٠٠

- نزيف أو كدمات غير متوقعة

أتورفاستاتين من فئة الأدوية المعروفة باسم الأدوية الطبيعية اسألى الطبيب أو الصيدلي للحصول على الآثار الجانبية نادرة جدا (أقل من ١ في كل ١٠,٠٠٠ شخص) ما يلى:

الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، عندما يكون - هذا الدواء عادة لا يؤثر على قدرتك على القيادة أو المفاجئ أو ضيق، وتورم في الأجفان والوجه والشفاه اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وتغيير غط الحياة تشغيل الآلات. لكن تجنب القيادة إذا كان هذا الدواء والفم واللسان أو الحلق، صعوبة في التنفس، والانهيار - فقدان السمع

ضيق في التنفس أو الحمى

- الاحتفاظ بالدواء بعيدا عن متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية يَشير إلى اليوم الأخير من ذلك

- يجب أن تأخذ أتوركور كما وصف لك طبيبك تماما مع الصحي أو النفايات المنزلية.

-المادة النشطة هي أتورفاستاتين كالسيوم. كل قرص يحتوي على ٨٠ مجم من أتورفاستاتين.

- مونوهيدرات اللاكتوز • مغنيسيوم إستارات
- الصوديوم لورايل سلفا میکروکریستالین سیلولوز
- السيليكا اللامائية الغروية بیوتایل هیدروکسی انوسول • كروسبوفيدون
- كربونات هيدروجين الصوديوم • سكر القصب
  - و صوربیتان ترای ستیارات • ماكروجيل إستارات ٤٠
- ننائي الميثيكون ۰ ۲-برومو-۲-نایتروبروبین-۱٫۳-دیول
  - 🎳 ھايبرميلوز

ثاني أكسيد التيتانيوم • ماكروجول ٤٠٠٠ ما هو شكل أتوركور ٨٠مجم ومحتويات العلبة؟

أتوركور ٨٠مجم قرص اسطواني، ثنائي التحدب، أبيض اللون و يمكن تقسيمه. تحتوی علبة أتوركور ۸۰مجم علی ۲۸ قرص مغلف، ۷ أقراص في كل شريط.

حامل ترخيص التسويق والمصنع Laboratorios Cinfa, S.A. C/Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta 31620 Huarte - Pamplona (Navarre) - Spain

> تكنات أخى: أتوركور ١٠ مجم أقراص مغلفة أتوركور ٢٠ مجم أقراص مغلفة

> > لدواء وبنفعه وضرره.

أتوركور ٤٠ مجم أقراص مغلفة وتمت الموافقة على هذه النشرة ديسمبر ٢٠١٢

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر. اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك. - إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران في

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء - لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال. مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصبادلة العرب

Laboratorios Cinfa, S.A. Olaz Chipi 10 P.I. Areta 31620 Huarte Pamplona Navarre. SPAIN

- الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

إذا لاحظت حدوث أي من الأعراض الجانبية المذكورة تجنب تناول كميات كبيرة من الكحول مع هذا الدواء. آلام في المعدة) داخل النشرة قم بابلاغ الطبيب أو الصيدلي وهذا التفاصيل أنظر القسم رقم ٢.

ماذا يوجد بهذه النشرة؟

٢- ماذا يجب أن تعرف قبل استخدام أتوركور ٨٠مجم؟ الحمل و الرضاعة:

٣- كيف تتناول أتوركور ٨٠مجم ؟

٥- كيف يتم حفظ أتوركور ٨٠مجم ؟ ٦- محتويات العلبة و معلومات أخرى.

أتوركور يُستخدم للحد من المواد الدهنية مثل القيادة وإستخدام الآليات:

وحده غير كافي.

٢- ماذا يجب أن تعرف قبل استخدام أتوركور ١٠مجم؟ التحمل لبعض السكريات. لا تتناول أتوركور ٨٠مجم:

لوظائف الكبد في الوقت الحالي أو في أي وقت مضي. للقوم بضبط الجرعة كل ٤ أسابيع أو أكثر. - إذا كنت امرأة قادرة على الإنجاب و لا تستخدمين - الجرعة القصوى من أتوركور هي ٨٠ مجم مرة واحدة على العلبة.

اذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية

بنزيف في المخ، أو تعانى من وجود سائل في جيوب إذا كنت غير متأكد. صغيرة في المخ من أثار السكتات الدماغية السابقة.

> اذا كان لديك آلام متكررة أو غير مبررة في العضلات، اذا تناولت جرعة زائدة من أتوركور: أو إذا كان لديك تاريخ شخصي أو عائلي من مشاكل في - في حالة تناول جرعة زائدة أو جرعة على سبيل الخطأ المواد الأخرى هى:

> > -الاستاتين أو الفيبريتس).

- إذا كنت تتناول الكحول بكميات كبيرة بانتظام, - إذا كنت أكثر من ٧٠ سنة من العمر.

المخاطر المحتملة المتصلة بالعضلات. من المعروف جانبية، على الرغم من أنه ليس بالضرورة أن يعاني

الأدوية (من فضلك راجع قسم ٢).

هذا النوع من التفاعل قد يؤدى إلى تخفيف آثار أحد والوجه والحلق التي يمكن أن تسبب صعوبة كبيرة في أو كل من هذه الأدوية. من ناحية أخرى، استخدام التنفس. هذه الأدوية مجتمعة قد يُزيد من خطر أو شدة الآثار - توعك الشديد مع تقشير شديد وتورم في الجلد، الجانبية، بما في ذلك حالة خطيرة تُعرف باسم انحلال وظهور تقرحات في الأعضاء التناسلية الجلدية والفم الربيدات، والذي يسبب تدهور العضلات، لمزيد من والعينين، والحمى. طفح جلدي مع بقع حمراء خاصة

بعض المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة قد يكون سببه تكسر العضلات والتي يمكن أن تكون للفطريات، على سبيل المثال إريثروميسين، مهددة للحياة، وتؤدي إلى مشاكل في الكلى. كلاريثروميسين، تيليرثروميسين، الكيتوكونازول، نادرة جدا: تصيب أقل من ١ في كل ١٠,٠٠٠ شخص: فلوكونازول، الاىتراكونازول،

بعض حاصرات قنوات الكالسيوم التي تُستخدم لعلاج • • • • **شخص) ما يلي:** الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال - التهاب في الممرات الأنفية، ألم في الحلق، نزيف في

فرابامیل، امیودارون. - مثبطات الأنزيم البروتيني التي تُستخدم لعلاج مرض السكري مواصلة الرصد الدقيق لمستويات السكر الإصابة بفيروس نقص المناعة على سبيل المثال في الدم)، وزيادة في كيناز الكرياتين في الدم

الأدوية الأخرى المعروفة بالتفاعل مع أتوركور و هي - الغثيان، والإمساك، والرياح، وعسر الهضم والإسهال إزيتيميبي (الذي يخفض الكولسترول)، الوارفارين - آلام المفاصل، وآلام في العضلات وآلام الظهر (المُستخدم للحد من تخثر الدم)، وسائل منع الحمل - نتائج فحص الدم التي تظهر أن وظيفة الكبد قد عن طريق الفم، استيريبنتول (المستخدم في علاج تصبح غير طبيعية الصرع)، السيميتيدين (المستخدم لعلاج قرحة الجهاز الآثار الجانبية غير شائعة (يؤثر على ١ إلى ١٠ في كل الهضمي)، فينازون (مسكن) ومضادات الحموضة ١٠٠٠ شخص) ما يلي:

- اصفرار الجلد وبياض العينين.

- الحساسية - أعراض قد تشمل التنفس وألم في الصدر

- مشاكل التنفس بما في ذلك السعال المستمر و / أو

: إذا كان لديك حساسية من مادة أتورفاستاتين، أو أي - قبل بدء العلاج، سوف يقوم طبيبك بارشادك لاتباع إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو إذا لاحظت عقار مشابه يُستخدم لخفض مستويات الدهون في نظام غذائي منخفض الكوليسترول و الذى يجب أن أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

- لا تستخدم الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود

لا تتخلص من أي الأدوية عن طريق مياه الصرف

تستخدم وهذه التدابير تساعد في حماية البيئة. ٦- محتويات العلبة و معلومات أخرى.

الجرعة التالية في ميعادها. - لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة. اذا قمت بايقاف تناول أتوركور ٨٠مجم:

ازدياد الآثار الجانبية المتصلة بالعضلات مع بعض جميع المرضى من هذه الأعراض. - إذا كنت تعتقد في خطورة أي من الآثار الجانبية أو إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المذكورة في هذه النشرة،

في راحتي اليدين أو باطن القدمين التي قد تكون بثور.

فوريكونازول، - إذا واجهت مشاكل مع نزيف غير متوقع أو غير عادي أو كدمات، وهذا قد يشير إلى اصابة بالكبد. يجب

نفسه، تشعر بتوعك أو لديك ارتفاع في درجة الحرارة

الآثار الجانبية الاكثر شيوعا (يؤثر على ١ إلى ١٠ في كل

الزيادة في مستويات السكر في الدم (إذا كان لديك

النشرة الداخلية: معلومات للمستخدم أتوركور ٨٠مجم أتورفاستاتن - أقراص مغلفة

إستشر الطبيب أو الصيدلى إذا كان لديك إستفسارات أتوركور ٨٠مجم والطعام والكحول

تم وصف الدواء لك أنت فقط فلا تقم بوصفه إلى كيفية تناول أتوركور آخرين لأنه من الممكن أن يسبب لهم الضرر حتى و إن الحفاظ على النقاط التالية في الاعتبار: كانوا يعانون من نفس الأعراض التي تعاني منها.

يشمل أي الآثار الجانبية المحتملة غير المدرجة في هذه عصير جريب فروت:

٤- الأعراض الحانسة المحتملة.

# ۱- ما هو أتوركور ۸۰مجم و ما هي دواعي - لا ينصح بأستخدام أتوركور أثناء الرضاعة.

المخفضة للكوليسترول، وتُستخدم لتنظيم الدهون.

الدم أو أي من مكونات الدواء (راجع القسم ٦).

وسائل منع حمل مكن الاعتماد عليها - إذا كنت حاملا أو تنوين ان تصبحى حاملا.

في أي وقت مضى أي من الحالات التالية:

اذا كان لديك إنخفاض في نشاط الغدة الدرقية.

العلاج بأى أدوية أخرى للحد من المواد الدهنية (مثل اذا نسيت تناول أتوركور ٨٠مجم:

استشر طبيبك أو الصيدلي قبل اتخاذ أتوركور

تناول الأدوية الأخرى: مكن لبعض الأدوية التأثير على كيفية عمل أتوركور يُرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي على الفور.

حاملا إلا إذا كنت تستخدمين وسائل موثوقة لمنع - اضطرابات الرؤية

يؤثر على قدرة القيادة الخاصة ىك

٣- كيف تتناول أتوركور ٨٠مجم ؟

سینفا هی ۱۰ مجم یومیا.

فيجب إخطار طبيبك او الصيدلي فورا مع تحديد الدواء

وربما خلال فترة العلاج الخاص مع أتوركور لتحديد - مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا

- الحساسية الخطيرة التي تسبب تورم في اللسان

· غيرها من الأدوية المستخدمة لتنظيم مستويات عليك استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

الكولىسترول.

- إذا كان لديك إضطراب غير مفهوم في اختبارات الدم 🕟 قد يُزيد طبيبك هذه الجرعة إذا لزم الأمر و سوف 🕒 لا تخزن في درجة حرارة فوق ٢٥ درجة مئوية.

التحذيرات والاحتياطات: أتوركور قد لا يكون مناسبا لك إذا كان لديك حاليا أو وجبات.

اذا كان لديك مشاكل في الكلى.

اذا كان لديك فشل حاد في الجهاز التنفسي. في أي حالة من هذه الحالات ، سوف يقوم طبيبك الصيدلي. بتحديد ما اذا كنت تحتاج لعمل اختبارات الدم قبل ع- الأعراض الجانبية المحتملة.

المعلومات حول هذه الحالة، يرجى مراجعة قسم ٣.

بوساكونازول، ريفامبين أو حمض الفوسديك.

املوديبين و ديلتيازيم، العقاقير المستخدمة لتنظيم معدل ضربات القلب، على سبيل المثال الديجوكسين، - الحساسية

(منتجات عسر الهضم التي تحتوي على الألومنيوم أو - فقدان الشهية، وزيادة الوزن، وانخفاض في مستويات

يجب قراءة ما بداخل هذه النشرة بعناية قبل إستخدام يجب دامًا إبلاغ الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو - الكوابيس، والأرق من فضلك انظر القسم ٣ للحصول على تعليمات حول - عدم وضوح الرؤية الكحول:

مكن أن يتفاعل عصير الجريب فروت مع أتوركور إذا الشعر تم تناوله بكميات كبيرة. وفقا لذلك، تجنب تناول هذا - آلام الرقبة، ووهن العضلات ١- ما هو أتوركور ٨٠مجم و ما هي دواعي الاستخدام؟ الدواء مع أكثر من كوب أو كوبين صغيرين من العصير. - الوهن، والشعور بالإعياء والضعف وألم في الصدر،

حاملا أو تنوين الحمل. - لا تأخذى أتوركور إذا كنت قادرة على أن تصبحى شخص ما يلي:

> - لم يثبت أن أتوركور يكون أمن أثناء الحمل والرضاعة - اصابة الوتر المشورة قبل تناول أي دواء.

إذا كان لديك ارتفاع نسبة مخاطر الإصابة بأمراض - تجنب استخدام الأدوات أو الآلات إذا كان هناك تأثير - تضخم الثدي في الرجال والنساء. القلب، أتوركور يمكن أن يساعد على الحد من هذه في القدرة على استخدامها بسسب تناول هذا الدواء. عن التأثيرات الجانبية المحتملة مع بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول (الأدوية من نفس النوع): المخاطر، حتى لو كانت مستويات الكولسترول طبيعية. معلومات هامة عن بعض مكونات أتوركور ٨٠مجم: خلال فترة العلاج، يجب اتباع حمية منخفضة - هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز والسكروز. استشر - صعوبات جنسية الطبيب قبل تناول هذا الدواء ان كنت تعاني من عدم - الاكتئاب

يُتبع أثناء العلاج أتوركور. - إذا كان لديك أي مرض كبدى حاليا أو في أي وقت - بدءا الجرعة المعتادة القياسية الأولية للأتورفاستاتين - **٥- كيف يتم حفظ أتوركور ٨٠مجم؟** 

- ما لم يقرر الطبيب شيئا أخر، يجب ابتلاع حبة الشهر. أتوركور مع كمية كافية من السوائل (كوب من الماء) - لا تستخدم الدواء إذا لاحظت أن هناك علامات ويمكن أن تؤخذ في أي وقت من النهار، مع أو بدون تدهور لحالتك.

> - سوف يحدد طبيبك مدة العلاج مع أتوركور. یرجی استشارة طبیبك إذا كنت تعتقد أن مفعول علی ماذا یحتوی أتوركور ۸۰مجم؟ أتوركور قوي جدا أو ضعيف جدا.

> > - إذا كنت قد نسيت تناول الجرعة، فبجب تناول

- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء أو ترغب في التوقف عن العلاج ، اسأل طبيبك أو

الأدوية المستخدمة لتنظيم الجهاز المناعي، على سبيل - ضعف العضلات، أو الألم وبشكل خاص، إذا في الوقت

الصداع

يوميا.

- إذا كان لديك سابقا مشاكل في العضلات خلال فترة والكمية التي تم تناولها.

إذا كان لديك تاريخ لمرض من أمراض الكبد.

وآثار بعض العقاقير يمكن أن تتغير إذا كنت تأخذ نادر: يصيب ١ إلى ١٠ في كل١٠٠٠٠٠ شخص:

الدهون، وعلى سبيل المثال جيمفيبرازول، الفايبريتس غيرها من الآثار الجانبية المحتملة مع أتوركور:

ريتونافير، لوبينافير، اتازانافير، ايندينافير، دارنافير.

الاستخدام؟