

Ziquin 500 mg film-coated tablets

Levofloxacin

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet.

In this leaflet:

1. What Ziquin is and what it is used for
2. Before you take Ziquin
3. How to take Ziquin
4. Possible side effects
5. How to store Ziquin
6. Further information

1. What Ziquin tablets are and what they are used for

What this medicine is

The active substance in your tablets is levofloxacin. This belongs to a group of medicines known as fluoroquinolone antibiotics, which kill bacteria.

What this medicine does

Ziquin tablets are used to treat infections caused by bacteria that are sensitive to levofloxacin. Your doctor will have decided if your infection can be treated with this medicine. Ziquin can be used to treat infections of the:

- Sinuses
- Lungs, in people with long-term breathing problems or pneumonia
- Urinary tract, including your kidneys or bladder
- Prostate gland, where you have a long lasting infection
- Skin and underneath the skin, including muscles. This is sometimes called ‘soft tissue’.

2. BEFORE YOU TAKE ZIQUIN TABLETS

Do not use Ziquin tablets

- if you are allergic (hypersensitive) to Levofloxacin or to other active substances that belong to the same group of antibiotics (i.e. quinolones) or to any of the other ingredients of the medicine.
- if you suffer from epilepsy. Otherwise, your risk of getting “fits” (convulsions) is increased.
- if you had ever had tendon problems (e.g. tendonitis) relating to treatment with an active substance that belongs to the same class of antibiotics (i.e. fluoroquinolones).
- if you are or planning to become pregnant or if you are breast feeding.
- if the tablets have been prescribed to children or growing teenagers. They could harm the cartilage of their growing bones. **The tablets are only intended for adults.**

Tell your doctor if you have had any problems with taking medicines in the past.

Take special care with Ziquin tablets

- if you have experienced “fits” or brain damage in the past (such as stroke or severe brain injury). Make sure your doctor knows about your medical history, so he can give you appropriate advice.
- when you are exposed to sunlight or UV light. Do not stay out in strong sunlight for unnecessarily long periods and do not use a sun-lamp or solarium. Your skin may become more sensitive to light whilst using this medicine (may cause sunburn – like reactions).
- if you get pain or inflammation in your tendons, particularly if you are elderly or taking any medicines known as the corticosteroids (cortisone or similar medicines used as anti-inflammatorys in many disorders such as asthma, allergic conditions/reactions and arthritis). If you experience any tendon complaints whilst or shortly after taking the tablets you should seek medical advice immediately and rest the affected limb to avoid tendon damage. Do not take the next dose of Ziquin unless your doctor tells you to.
- if you have severe, persistent and/or bloody diarrhoea during or after treatment with the tablets. This may be a sign of serious bowel inflammation (*pseudomembranous colitis*) which can occur following treatment with antibiotics. Tell your doctor immediately. It may be necessary to stop treatment and start specific therapy.
- if you have a family history of or have an actual defect of the liver enzyme called glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) (a rare hereditary disease). Patients with G6PD deficiency may be prone to destruction of red blood cells (haemolysis) when treated with quinolone antibacterial agents.
- if you suffer from kidney problems. Patients with reduced kidney activity (renal insufficiency) may need lower doses than patients with normal kidney activity.
- if you are taking any medicines which thin the blood (known as anti-coagulants e.g. warfarin).
- if you have ever had mental health problems. Tell your doctor immediately if your opinion and thoughts change (a psychotic reaction).
- if you have ever had symptoms due to nerve damage such as movement or sensory problems in hand and feet, that are more severe at night.
- if you have ever had heart problems.
- if you are diabetic and taking medicines by mouth that lowers blood glucose levels.
- if you have ever had liver problems. You should stop treatment and contact your doctor immediately if symptoms of liver disease develop such as reduced appetite, yellowing of the skin or whites of the eyes (jaundice), dark urine, itching or gastrointestinal disturbances.
- if you have allergic reactions to the medicine. In that case, you should stop treatment immediately and contact your doctor or an emergency doctor.

الباقين وكبار السن.

التهابات الجيوب الأذنية

- قرص واحد من Ziquin ٥٠٠م.للمجم، كل يوم.

إنتهاب الشعب الهوائية المزمن

- قرص واحد من Ziquin ٥٠٠م.للمجم، كل يوم.

الانتهاب الرئوي

- قرص واحد من Ziquin ٥٠٠م.للمجم، مرة أو مرتين كل يوم.

إنتهاب المسالك البولية المساعف، بما في ذلك التهابات الكلئ.

- ١/٢ قرص من Ziquin ٥٠٠م.للمجم، كل يوم.

إنتهاب البروستاتا البكتيري المزمن.

- قرص واحد من Ziquin ٥٠٠م.للمجم ، كل يوم.

إنتهابات البكتيرية بالجلد و الأنسجة الرخوة.

قرص واحد من Ziquin ٥٠٠م.للمجم ، مرة أو مرتين كل يوم .

كلر السن الذين يعانون من مشاكل بالكلي

الطبيب قد يقرر كل جرعة أقل

الأطفال والمراهقين، يجب عدم وصف هذه الفئة من الأدوية للأطفال والمراهقين.

إذا تناولت أكثر من الجرعة المحددة من Ziquin

إذا أخذت حبة واحدة أكثر من مرة بتطريق الخطأ، فمن غير المرجح أن يحدث أي شيء، إذا تناولت أقراص عديدة عن غير قصد، فطليك إبلاغ الطبيب أو الذهاب إلى خدمات الطوارئ. قد خلية الدواء موك إذا كان ذلك ممكنا. لإظهارها للطبيب، إذا كنت قد تناولت أقراص كثيرة جدا، قد تواجه الارتباك، والوخة، وفقدان الوعي ونوبات صرع، وعدم انتظام ضربات القلب.

في حالة حدوث نوبات جرعة زائدة ، استشر طبيبك فوراً أو الصيدلي.

إذا كنت قد نسيت أن تأخذ Ziquin

إذا كنت قد نسيت أن تتناول جرعة من هذا الدواء، تناولها في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك، إذا كان الوقت قد حان تقريبا لتناول الجرعة التالية فانتظر وتناول الجرعة في الموعد المحدد و لا تتناول الجرعة المنسية. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن تناول Ziquin

من المهم استكمال مدة العلاج، لا تتوقف عن تناول Ziquin بمجرد ذلك قد تشعر بالتحسن، إذا توقفت عن تناول الدواء بعد فترة قصيرة جدا، فقد تظهر العدوى مرة أخرى أو قد تعود سرياً. إذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء، حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية، مثل الشعور بالغثاء أو آلام في العضلات، فاستشر طبيبك أو أخصو

كيا هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها. على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية: من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

على الرغم من أن ليس كل الناس يعانون منها، اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية النادرة التالية:

من النادر جدا أن تحدث الحساسية الشديدة. وهذا يمكن أن يحدث بعد الجرعة الأولى أو حتى بعد توقف العلاج، إذا عانيت من أي من الآثار الجانبية التالية مع تناول الدواء، أوقف الدواء فوراً وأجر طبيبك أو اذهب إلى أقرب قسم للطوارئ، علامات الحساسية هي:

٤-الآثار الجانبية المحتملة

كما هو الحال مع جميع الأدوية الأخرى، قد تتج آثار جانبية مع تناول Ziquin

كما هو الحال مع أي دواء، ولكن ليس كل الناس يعانون منها.

-انخفاض حاد في خلايا الدم البيضاء.

-المشاكل النفسية، مثل الهلوسة (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة) و / أو هذيان

-القلق، والارتباك

-التحضر، والارتباك

-نوبات الصرع

-الرعشة

-وخز في اليدين والقدمين

-سرعة ضربات القلب

-انخفاض الضغط الشرياني

-صعوبة في التنفس يمكن أن تصبح خطيرة (ضيق التنفس)

-الإسهال الدموي

-التهاب الجلد و حكة

- ألم والتهاب في الأوتار (على سبيل المثال، في وتر العرقوب)</